

Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning kategori A

Inventory, Control Document and User Instructions Category A



Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning over lægemiddelstoffer og medicinsk udstyr kategori A

Jf. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, Kapitel IX B

Inventory, Control Document, and User Instructions of Active Pharmaceutical Ingredients and Medical Equipment Category A

Cf. Danish Maritime Authority Notice A, chapter IX B

October 2021

ISBN: 978-87-7454-210-0

Identifikation af skib / Identification of ship

Skibsnavn / *Ship Name*:

Kaldesignal / *Call Signal*:

IMO nummer / *IMO Number*:

Hjemmehavn / *Port of Reg.*:

|

Medicin certifikat / *Medicine Certificate*

Dette dokument anses for at udgøre skibets medicin certifikat.

Det attesteres herved, at medicin og medicinsk udstyr er efterset og fundet i overensstemmelse med Den Danske Søfartsstyrelses krav jf. Meddelelser A Kapitel IX B.

This document is considered to represent the ships certificate of medicine.

It certifies that medicine and medical equipment has been inspected and found in compliance with the Danish Maritime Authority's requirement cf. Notes A chapter IX B.

Skibsnavn / *Ship Name*:

Kaldesignal / *Call Signal*:

IMO nummer / *IMO Number*:

Hjemmehavn / *Port of Reg.*:

Dato / <i>Date</i>	Rank / <i>Rank</i>	Navn / <i>Name</i>	Underskrift / <i>Signature</i>
	Skibsfører / <i>Master</i>		
Næste eftersyn / <i>Next inspection</i>			
Dato / <i>Date</i>	Rank / <i>Rank</i>	Navn / <i>Name</i>	Underskrift / <i>Signature</i>
	Skibsfører / <i>Master</i>		

Print denne side / *Print this page*

Certifikat for genoplivningsudstyr (A.1)

Certificate resuscitation equipment (A.1)

Det attesteres herved at det **mobile genoplivningsudstyr (A.1)** er efterset og fundet i overensstemmelse med Den Danske Søfartsstyrelses krav jf. Meddelelser A Kapitel IX B.

It certifies that the **mobile resuscitation equipment (A.1)** has been inspected and found in compliance with the Danish Maritime Authority's requirement cf. Notes A chapter IX B.

Skibsnavn / *Ship Name*:

Kaldesignal / *Call Signal*:

IMO nummer / *IMO Number*:

Hjemmehavn / *Port of Reg.*:

Dato / <i>Date</i>	Rank / <i>Rank</i>	Navn / <i>Name</i>	Underskrift / <i>Signature</i>
	Skibsfører / <i>Master</i>		
Næste eftersyn / <i>Next inspection</i>			
Dato / <i>Date</i>	Rank / <i>Rank</i>	Navn / <i>Name</i>	Underskrift / <i>Signature</i>
	Skibsfører / <i>Master</i>		

Print denne side / *Print this page*

Indhold / Contents

Bruger guide / User Guide	4
Anvendte forkortelser / Used abbreviations	8
Brugervejledning Lægemidler/– User Instruction Active Pharmaceutical Ingredients	9
Fortegnelse over Lægemidler / Inventory of Active Pharmaceutical Ingredients	57
Besætningens medbragte medicin / Crew member’s private medicine.....	63
Fortegnelse over Medicinsk udstyr / Inventory of Medical equipment	65
Etiketter Lægemidler / Labels Active Pharmaceutical Ingredients	73
Indeks / Index	77
Rekvistion – Lægemidler / Requisition - Active Pharmaceutical Ingredients.....	82
Rekvistion - Medicinsk udstyr / Requisition - Medical Equipment	87
Ændringer / Changes.....	95
Ekstra medicin og udstyr –COVID-19 / Extra medicine and Equipment COVID-19	97

De Danske Medicinkister

Medicinkisten angiver medicin/medicinsk udstyr, som Radio Medical Danmark og Søfartsstyrelsen har foretrukket indenfor de rammer som EU-direktiv 92/29/EØF og den Danske lægemiddelstyrelse har givet.

Guide til:

Brugervejledning:

Første kolonne beskriver de indikationer, lægemiddelstoffet er beregnet til. De samme indikationer kan slås op i indekset bagerst i hæftet. Første kolonne beskriver også om et lægemiddelstof skal anvendes sammen med andre lægemiddelstoffer. I sådanne tilfælde er der lavet henvisninger til de relevante lægemiddelstoffer.

Anden kolonne oplyser, lægemiddelstoffets hoved- og undergruppenummer.

Tredje og fjerde kolonne indeholder rækker med oplysninger om:

- **Lægemiddelstoffet:** Beskriver det aktive stof i lægemidlet. Som et eksempel kan nævnes 3.1 Paracetamol. Det forhandles over hele jorden under mange forskellige handelsnavne. Derfor kan man uanset forskellige handelsnavne, altid finde lægemidlet, hvis man kender lægemiddelstoffet.
- **Form:** Beskriver om lægemiddelstoffet skal findes som kapsel, tablet, suppositorier, injektionsvæske, infusionsvæske, creme, salve, afdelte pulver, mund spray, brusetablet, klymsa, oral opløsning eller inhalation. Form beskriver også styrken af det enkelte lægemiddelstof pr ml eller per tablet.
- **Virkning** beskriver den forventende virkning af det enkelte lægemiddel.
- **Dosering** beskriver den anbefalede dosis ved de tilstande, der er beskrevet i kolonnen indikation. Her beskrives ligeledes lægemidlets form og administrationsmåde.
Bemærkning: Radio Medical kan ordinere andre doser og administrations måder.
- **Bivirkninger** nævner de mest almindelige bivirkninger beskrevet i Dansk Lægemiddelinformation, www.medicin.dk
- **Holdbarhed** beskriver holdbarhedstiden fra produktions datoen. Holdbarhedstiden beskrevet i denne fortegnelse er fremkommet ud fra det danske handelsnavn med længst holdbarhed.
Bemærkning: Der tages forbehold for at holdbarhedstiden kan ændres.
- **Opbevaring** beskriver om der er særlige krav til opbevaring. Lægemidler skal generelt opbevares tørt og beskyttet mod lys. De fleste lægemidler tåler "almindelig temperatur" defineret som normal stuetemperatur op til 22-24° C.
- **Anmærkninger** beskriver, om der bør søges samråd med Radio Medical Danmark inden anvendelse af lægemiddelstoffet. Desuden beskrives, om der er specielle forholdsregler til det specifikke lægemiddelstof.

Advarsel: Lægemiddelstoffer, der har været opbevaret forkert, eller er blevet for gamle, kan være sundhedsskadelige

The Danish Medicine Chest's

The medicine chest indicates the Active Pharmaceutical Ingredients / medical equipment that Radio Medical Denmark and Danish Maritime Authority have preferred within the framework of the EU Directive 92/29 / EEC and the Danish Medicines Agency.

Guide to:

User Instruction:

First column describes the indication the Active Pharmaceutical Ingredients is intended for. The same indications can be looked up in the index at the back of the booklet. First column also describes whether an Active Pharmaceutical Ingredient should be used together with other Active Pharmaceutical Ingredients. In such cases, a reference is made to the relevant Active Pharmaceutical Ingredient.

Second column describes the Active Pharmaceutical Ingredient main and subgroup numbers.

Third and fourth column contains a number of information about:

- **The Active Pharmaceutical Ingredients:** describe the Active Pharmaceutical Ingredients in the medicine. An example is 3.1 Paracetamol, which is sold all over the world under many different trade names. Regardless of different trade names is it always possible to locate the medicine, if you know the Active Pharmaceutical Ingredients.
- **Form:** describes if the Active Pharmaceutical Ingredients is available as capsules, tablets, suppositories, injection liquid, infusion liquid, lotion, ointment, divisional powder, mouth spray, effervescent tablets, enema, oral solution or inhalation. Form also describes the strength of each Active Pharmaceutical Ingredients per ml or per tablet.
- **Effect** describes the expected effect of each Active Pharmaceutical Ingredients.
- **Dosage** describes the recommended dose for the condition described in the column indication. The form of the Active Pharmaceutical Ingredients as well as the usual administering is mentioned.
Note: Radio Medical may prescribe different doses and ways of administering.
- **Side effects** describes the most common side effects mentioned in the Danish Drug Information, www.medicin.dk. There is currently no English version.
- **Durability** describes the time of durability from date of production. The durability mentioned in this record is derived from the Danish trade name with the longest durability.
Note: Durability may be subject to change.
- **Storage** describes if special storage precautions are needed. The Active Pharmaceutical Ingredients should generally be kept dry and protected from light. Most medicaments tolerate "normal temperature" defined as normal room temperature up to 22-24° C.
- **Remarks** describe whether it is recommended to seek advice from Radio Medical Denmark before using the Active Pharmaceutical Ingredients. In addition, precautions needed for the specific Active Pharmaceutical Ingredients are described.

Warning: Active Pharmaceutical Ingredients which have been stored improperly or are too old can be harmful to health.

Guide til:

Fortegnelse og kontrol dokument over lægemiddelstoffer

Publikationen indeholder en fortegnelse over de lægemiddelstoffer, der skal være ombord.

Rækkerne

Lægemiddelstofferne er organiseret i hovedgrupper efter deres hovedanvendelsesområde. Eksempelvis er alle smertestillende lægemiddelstoffer organiseret i gruppe 3.

Kolonnerne

Første kolonne beskriver hvert enkelt lægemiddelstof nummer. Eksempelvis har morfin nummeret 3.4, hvor tallet før punktum referer til hovedgruppen, og tallet efter referer til det specifikke lægemiddelstof. Lægemiddelstofferne i skibets hospital skal så vidt muligt organiseres efter dette nummersystem

Anden kolonne beskriver ATC koden, et klassifikations system for medicin. Se mere på www.whocc.no

Tredje kolonne beskriver lægemiddelstoffet.

Bemærkning: Efter lægemiddelstoffet kan være anført et "Δ", dersom produktet er sløvende, og et "K", dersom produktet skal opbevares i køleskab.

Fjerde kolonne beskriver under "Adm.form", om lægemiddelstoffet skal findes som kapsel, tablet, suppositorier, injektionsvæske, infusionsvæske, creme, salve, afdelte pulver, mund spray, brusetablet, klyasma, oral opløsning eller inhalation.

Femte kolonne beskriver styrken pr tablet eller pr. ml.

Sjette kolonne beskriver mindste mængde, skibet skal medbringe. Skibet må gerne medbringe større mængder end det beskrevne.

Besætningens medbragte medicin

Besætningen har ret til at medbringe egen medicin under den forudsætning, at de til stadighed har en gyldig helbredsundersøgelse for søfarende og fiskere. Medbragte lægemidler skal oplyses til skibsføreren eller sygdomsbehandleren. Lægemidlet skal indskrives med følgende oplysninger:

- Lægemidlets navn
- Navn på besætningsmedlem
- Mængde og antal
- Daglig dosis
- Dato ind
- Eventuel kvittering for modtagelsen. (Kun hvis lægemidlet opbevares på sygelukafet)
- Dato ud
- Kvittering for modtagelsen (Kun hvis lægemidlet har været opbevaret på sygelukafet)

Guide to:

Inventory and Control Document of Active Pharmaceutical Ingredients.

The publication contains an inventory of mandatory Active Pharmaceutical Ingredients on board.

The rows

The Active Pharmaceutical Ingredients are organized into main groups according to field of application. As an example all analgesics are organized in group 3.

The columns

First column describes each individual Active Pharmaceutical Ingredient by number. For example, morphine number 3.4, where the number before the dot refers to the main group and the number after the dot refers to the specific active pharmaceutical ingredients. The Active Pharmaceutical Ingredients in the ship's hospital must as far as possible be organized after this numbering system.

Second column describe the ATC code, a classification system on medicine. See more on www.whocc.no.

Third column describes the Active Pharmaceutical Ingredients.

Note: The Active Pharmaceutical Ingredients can be marked with a "Δ" if the product is sedative and a "R" if the product should be stored in a refrigerator

Fourth column describes under "Adm.form" whether the Active Pharmaceutical Ingredients should be available as capsules, tablets, suppositories injection liquid, infusion liquid, lotion, ointment, divisional powder, mouth spray, effervescent tablets, enema, oral solution or inhalation.

Fifth column describes the strength per tablet or per ml.

Sixth column describes the minimum amount the vessel must carry. The vessel may carry greater amounts than described.

Private medicine of crewmembers

The crew has a right to bring their own medicine, provided they possess a valid health certificate for seafarers and fishermen at all time. The master or the person in charge of medical care has to be informed about medicine brought along.

The medicine must be registered with the following information:

- Name of the medicine
- Name of crewmember
- Amount
- Daily dosage
- Date in
- Possible receipt for received medicine.
(Only if the medicine is stored at the sickbay)
- Date out
- Sign when medicine is returned
(Only if the medicine has been stored in the sickbay)

Guide til:

Fortegnelse og kontroldokument over medicinsk udstyr.

Publikationen indeholder en fortegnelse over det medicinske udstyr, der skal være om bord.

Rækkerne

Det medicinske udstyr er organiseret i hovedgrupper efter deres hovedanvendelsesområde. Eksempelvis er alle forbindinger og plastre organiseret i gruppe B.

Første kolonne beskriver det enkelte medicinske udstyrs bogstav og nummer. Eksempelvis har "Elastisk gazebind, ca. 4 cm x 4 m", kombinationen nummeret B.9, hvor bogstavet før punktum referer til hovedgruppen, og tallet efter referer til det specifikke medicinske udstyr.

Anden kolonne beskriver det specifikke medicinske udstyr.

Tredje kolonne beskriver den mindste mængde, skibet skal medbringe. Skibet må gerne medbringe større mængder end det beskrevne.

Det mobile genoplivningsudstyr A.1

Søfartsstyrelsen har fastsat regler om ilt og det mobile genoplivningsudstyr i gældende Meddelelser A kapitel IX B. Man kan derudover pakke førstehjælpsudstyr og lægemidler til førstehjælp sammen med det mobile genoplivningsudstyr. Der er udarbejdet forslag til pakning af et mobilt genoplivningsudstyr på www.soefartsstyrelsen.dk.

Etiketter

Publikationen indeholder en kopi af de etiketter, der skal være på lægemiddelstofferne ved leveringen. Kopien kan anvendes som kontrol af, at lægemidlet er korrekt og påført den korrekte etiket. Er det ikke tilfældet, bør skibsførerens rettede sin leverandør.

Ved køb af lægemiddelstoffer, kan en kopi af etiketterne afleveres ved leverandøren. Derefter skal leverandøren, før udlevering, påføre de korrekte etiketter,

Indeks

Indekset henviser til lægemiddelstoffernes brugervejledning. I indekset kan du søge på visse sygdomme, symptomer og alle lægemiddelstoffer.

Rekvision

I publikationen findes en bestillingsliste, hvor du blot udfylder de ønskede mængder af lægemiddelstof og medicinsk udstyr.

Medicinkiste- / Mobilt genoplivningsudstyr certifikat.

Mindst en gang årligt skal skibets lægemiddelstoffer og medicinske udstyr gennemgås. Det mobile genoplivnings udstyr skal kontrolleres hver 3 måned.

Ved gennemgangen kontrolleres mængden, opbevaringsforhold, udløbsdato og etiketter. Nåle, kanyler og metalinstrumenter kontrolleres for rust. Kontroller, at emballagen er intakt. Vær opmærksom på, at lægemiddelstof og medicinsk udstyr skal opbevares tørt og mørkt, og ikke må opbevares i nærheden af klor.

Dokumentation af 3 måneders og årlig inspektion.

På side 2 og 3 er Medicinkiste – og mobilt genoplivningsudstyrs certifikat, som også kan anvendes til dokumentation af inspektionerne. Siderne udskrives og underskrives af skibsføreren.

Guide to:

Inventory and Control Document Medical Equipment.

The publication contains an inventory of the mandatory medical equipment onboard

The rows

The medical equipment is organized into main groups according to their main field of application. For example all dressings and plasters are organized in group B.

First column describes each individual medical equipment by number. The "elastic gauze", approx. 4 cm x 4 m, carries the combination B.9. The letters before the dot refers to the main group, and the number after the dot refers to the specific medical equipment.

Second column describes the specific medical equipment.

Third column describes the minimum amount the vessel must carry. The vessel may carry larger quantities than described.

The Mobile Resuscitation Equipment A.1

The Danish Maritime Authority has established rules for oxygen and the mobile resuscitation equipment in the current Notice A chapter IX B. In addition you may pack equipment and medicine suited for first aid with the resuscitation equipment. Suggestions for the list may be found on www.dma.dk.

Labels

The publication contains copies of the labels that must be on each Active Pharmaceutical Ingredient, at the time of delivery. The copy may be used as verification of proper product and label. If labelling is incorrect, the master should guide his supplier.

When purchasing Active Pharmaceutical Ingredients a copy of the label may be delivered to the supplier. Then the supplier applies the correct labels before delivery.

Index

The index refers to the user instruction of active pharmaceutical ingredients. You can search for diseases, symptoms and Active Pharmaceutical Ingredients in the index.

Requisition

In the publication is a requisition form available. You simply fill in the required quantities of the active pharmaceutical ingredients and medical equipment.

Medicine chest- / Mobile resuscitation equipment certificate.

At least once a year the ship's Active Pharmaceutical Ingredients and medical equipment must be reviewed.

The mobile resuscitation equipment every 3 month.

When reviewing the quantities, storage conditions, expiry date and labels are controlled. Needles, cannulas and metal instruments are checked for rust. Check if the packaging is intact. Be aware that the Active Pharmaceutical Ingredients and equipment must be stored dry and dark, and not near chlorine.

Documentation of 3 months and annual inspection.

On page 2 and 3 is Medicine chest- and mobile resuscitation equipment's certificate's. It can also be used to document the inspections. The page's has to be printed and the Master has to sign them.

Dispensation for andet lægemiddelstof

Det er ikke til alle tider, og i alle lande muligt at indkøbe det foretrukne lægemiddelstof. Den danske Søfartsstyrelse og Radio Medical Danmark har derfor udarbejdet en liste med godkendte alternativer. Hvis det er muligt at indkøbe lægemiddelstoffer fra listen med godkendte alternativer med den korrekte koncentration, og indgiftsmåde, er det ikke nødvendigt at ansøge om dispensation.

Hvis apotek/forhandler tilbyder lægemiddelstof, som ikke findes på nogen liste, skal der søges om dispensation for anden medicin. Dette gøres på Søfartsstyrelsen hjemmeside, hvor der er en procedure for "Dispensation for anden medicin".

Listen over godkendte alternative, og dertil hørende labels og brugervejledninger kan downloades fra www.soefartsstyrelsen.dk. Listen med godkendte alternativer findes i Excel format.

Hjælp

Er der noget du er i tvivl om, står Søfartsstyrelsens "Center for det Maritime Sundhedsvæsen" til din rådighed. Adressen er:

CMS, Vestervejen 1, 6720 Fanø
Telefon: +45 7219 6004
Email: cms@dma.dk

Exemption for other active pharmaceutical ingredients

It is not at all times and in all countries possible to purchase the preferred Active Pharmaceutical Ingredients. The Danish Maritime Authority and Radio Medical Denmark have therefore drawn up a list of approved alternatives. If it is possible to purchase Active Pharmaceutical Ingredients from the list of approved alternatives with the correct concentration and method of administration, it is not necessary to apply for exemption.

If the pharmacy / retailer offer Active Pharmaceutical Ingredients that is not on the inventory- or alternative list, you must apply for an exemption. This is done on the DMA website, where there is a procedure for "exemption of medicine".

The list of approved alternative, and associated labels and user instructions can be downloaded from www.dma.dk. The list of approved alternatives is available in Excel format.

Help

If you have any questions, the Danish Maritime Authority's "Centre of Maritime Health Service" is at your disposal. The address is:

CMS, Vestervejen 1, 6720 Fanø
Telephone: +45 7219 6004
E-mail: cms@dma.dk

Anvendte forkortelser m.v. i Fortegnelse og Brugervejledning

afd. Pul.	=	afdelte pulvere
gel	=	gel til påsmøring på hud
htgl.	=	hætteglas
i. m.	=	intramuskulært = i musklen
inf. Væs.	=	infusionsvæske (til intravenøs brug)
inh. Pul.	=	inhalationspulver
inj. væske	=	injektionsvæske (til i.m. eller s.c.injektion)
i. v.	=	intravenøst = i en vene
"K"	=	opbevares i køleskab
klysma	=	klysma til anvendelse i endetarmen
linim.	=	liniment
gas	=	luftformig gasart til medicinsk anvendelse
mixtur	=	væske som drikkes
næsedr.	=	næsedråber
opløsn.	=	opløsning
s.c.	=	subcutant = under huden
supp.	=	suppositorier = stikpille til brug i endetarmen
Δ	=	sløvende medicin, kan påvirke evnen til maskinbetjening og vagttjeneste
π	=	Receptpligtig medicin

Used abbreviations etc. In the Inventory and User instruction

d.p.	=	divisional powder
gel	=	gel for application on the skin
c.v	=	cappedvials
i. m.	=	intramuscular = in the muscle
inf. fl.	=	infusion fluid (for intravenous use)
inh. p.	=	inhalation powder
inj. subst.	=	injection substance (for reconstitution before use)
inj. liquid	=	injection fluid (for i.m. or s.c. injection)
i. v.	=	intravenous = in a vein
"R"	=	stored in refrigerator
enema	=	enema for use in the rectum
linim.	=	liniment
gas.	=	gas for medical use
mixture	=	drinkable liquid
nose d.	=	nose drops
diss.	=	dissolution
s.c.	=	subcutaneous = under the skin
supp.	=	suppositories = suppository for rectal use
Δ	=	sedative medicine, may affect the ability to operate machinery and bridge duty
π	=	Prescription drugs

Brugervejledning Lægemiddelstoffer
User instruction Active Pharmaceutical
Ingredients

Grp. 1. Ilt / Oxygen

Bevidstløs uden vejtrækning Bevidstløs med vejtrækning Medtaget almen tilstand Slag mod kraniet Større kvæstelser Vejtrækningsbesvær	1.1+1.3	Lægemiddelstof:	Medicinsk ilt.
		Form:	Luft på trykflasker.
		Virkning:	Tilfører ilt til cellerne via de røde blodlegemer.
		Dosering:	Bevidstløse uden vejtrækning: Manuel ventilation med 15 liter per minut. Bevidstløse med vejtrækning: Maske med 9 liter/min. Øvrige tilstande: Maske med 1 til 9 liter/min.
		Bivirkninger:	Ilt er ufarligt til medicinsk brug.
		Holdbarhed:	Flaske: 3 år fra produktionsdato (Conoxia®, Linde Gas Therapeutics AGA)
		Opbevaring	Flasker holdes under 50°C
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Unconscious without breathing Unconscious with breathing Weak general condition Blows to the skull Severe injuries Breathing difficulties	1.1+1.3	Active Pharmaceutical ingredients:	Medical oxygen.
		Form:	Gas in pressurized bottles.
		Effect:	Induces oxygen to the cells via the red blood cells.
		Dosage:	Unconscious without breathing: Manual ventilation, 15 litres per minute. (A.1) Unconscious with breathing: Oxygen mask, 9 litres per minute. Other states: Oxygen mask, 1 to 9 litres per minute.
		Side-effects:	Oxygen is not dangerous when used for medicinal purposes.
		Validity:	Bottles 3 years from productions date (Conoxia®, Linde Gas Therapeutics AGA)
		Storage:	Keep away from flammable gases and substances. Keep bottle under 50° C
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> .

Grp. 2. Lokalbedøvelse / Local Anaesthetics

Lokalbedøvelse Syning af sår	2.1	Lægemiddelstof:	Lidocain.
		Form:	Injektionsvæske 10 mg/ml til subcutan injektion.
		Virkning:	Lokalbedøver på injektionsstedet. Virker efter 1 - 2 minutter. Virker i 2 - 3 timer.
		Dosering:	Mængden afhænger af sårets størrelse. Normalt anvendes 20 - 50 mg. Maksimaldosis er 20 ml svarende til 200 mg. Se Søfartsstyrelsens Lægebog.
		Bivirkninger:	Allergi er sjælden. Ved utilsigtet injektion i blodbanen kan der opstå: 1. føleforstyrrelser, svimmelhed, uklarhed og øresusen, 2. synsforstyrrelser, muskelrysten og kramper, 3. blodtryksfald og langsom puls.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Xylocain®, AstraZeneca).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur. Må ikke fryses.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Lokalbedøvelse skal ske i et rum med adgang til adrenalin (4.1) og genoplivningsudstyr (A.1). Risiko for alvorlige bivirkninger, hvis lidocain injiceres i blodbanen.

Local anaesthetics Suture of wounds	2.1	Active Pharmaceutical ingredients:	Lidocaine.
		Form:	Injection liquid, 10 mg/ml for subcutaneous injection.
		Effect:	Anaesthetises the place of injection. Takes effect after 1-2 minutes. Effective for 2-3 hours.
		Dosage:	The amount depends on the size of the wound. Normally, 20-50 mg is used. The maximum dose is 20 ml, equivalent to 200 mg. See the Danish Maritime Authority's Medical Manual.
		Side-effects:	Allergy seldom occurs. In case of an unintended injection into the bloodstream, the following side-effects may occur: 1. affective disturbances, dizziness, confusion, and buzzing in the ears, 2. visual disturbances, muscle contractions, and convulsions, 3. falling blood pressure and slow pulse.
		Validity:	3 years from the date of production (Xylocain®, AstraZeneca).
		Storage:	Normal temperature. Not to be frozen.
Lokalbedøvelse Kløestillende	2.2	Lægemiddelstof:	Lidocain.
		Form:	Gel, 20 mg/g (2%).
		Virkning:	Lokalbedøver hud og sårrande. Kløestillende.
		Dosering:	Anvendes som lokalbedøvelse ved smertende sår eller smertefulde procedurer, fx ved rengøring af brandsår eller større og forurenede sår. Et tykt lag gel påsmøres huden, der herefter afdækkes lufttæt i ca. 15 minutter. Virker efter ca. 15 minutter. Virker i ca. 30 minutter.
		Bivirkninger:	Allergi er sjælden.
		Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato (Xylocain®, AstraZeneca).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i>
Local anaesthetics Relieves itching	2.2	Active Pharmaceutical ingredients:	Lidocaine.
		Form:	Gel, 20 mg/g (2%).
		Effect:	Anaesthetises the skin and the edges of wounds. Relieves itching.
		Dosage:	To be used as local anaesthetics in case of painful wounds or procedures, e.g. cleansing of burns or large, dirty wounds. A thick layer is applied to the skin, which is subsequently covered in an air-proof condition for about 15 minutes. Takes effect after about 15 minutes. Effective for about 30 minutes.
		Side-effects:	Allergy seldom occurs.
		Validity:	2 years from the date of production (Xylocain®, AstraZeneca).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> .

Grp. 3. Smertestillende midler / Analgetics

Feber Svage smerter: Hovedpine Muskelsmerter Ledsmarter Rygsmerter MFAG tabeller: 7, 8, 13	3.1	Lægemiddelstof:	Paracetamol.
		Form:	Tabletter à 500 mg.
		Virkning:	Febernedsættende og smertestillende.
		Dosering:	Voksne: 1 g 3 - 4 gange dagligt. Højest 4 g per døgn.
		Bivirkninger:	Doser over 15 - 20 g indebærer risiko for leverskade, leversvigt og død.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Pamol Nycomed DK ApS)
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Ingen.
Fever Weak pains: Headache Muscle pains Pain in joints Back pains MFAG tables: 7, 8, 13	3.1	Active Pharmaceutical ingredients:	Paracetamol.
		Form:	Tablets of 500 mg.
		Effect:	Pain relieving and reduces fever.
		Dosage:	Adults: 1 g three-four times daily. Not more than 4 g daily.
		Side-effects:	Doses of more than 15-20 g involve liver damage, liver failure, and death.
		Validity:	5 years from the date of production (Pamol Nycomed DK ApS).
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	None.
Moderate smerter: Menstruationssmerter Ledsmarter Knoglesmerter Knoglebrud Muskelsmerter	3.2	Lægemiddelstof:	Ibuprofen.
		Form:	Tabletter à 400 mg.
		Virkning:	Smertestillende og febernedsættende.
		Dosering:	Voksne: 400 mg 3 - 4 gange dagligt. Højest 1800 mg per døgn. Undtagelsesvist op til 2400 mg per døgn i kortere perioder (4 - 6 uger).
		Bivirkninger:	Ondt i maven.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Ibumetin®, Nycomed Danmark).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> Bør ikke anvendes ved: 1. allergi for acetylsalicylsyre, 2. astmapatienter, 3. patienter i blodfortyndende behandling, 4. patienter med symptomer på mavesår.

<p>Moderate pain: Period pain Pain in joints Bone-ache Fractures Muscle pain</p>	3.2	Active Pharmaceutical ingredients:	Ibuprofen.
		Form:	Tablets of 400 mg.
		Effect:	Pain relieving and reduces fever
		Dosage:	Adults: 400 mg three-four times daily. Not more than 1800 mg daily. Exceptionally, up to 2400 mg daily for shorter periods of time (4-6 weeks).
		Side-effects:	Stomach ache.
		Validity:	5 years from the date of production (Ibumetin®, Nycomed Denmark).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> Not to be used in case of: 1. allergy to acetylsalicylic acid, 2. asthma patients, 3. patients in blood diluting treatment, 4. patients with symptoms of ulcer.
<p>Stærke smerter: Store sårskader Kvæstelser Forbrændinger Knoglebrud Nyresten Galdesten Blodprop i hjertet (se førstehjælp under 9.1 Nitroglycerin)</p>	3.4	Lægemiddelstof:	Morfin Δ .
		Form:	Injektionsvæske 10 mg/ml, ampuller à 1 ml.
		Virkning:	Smertestillende. Vækker velvære, virker afslappende. Virker efter 5 – 15 min ved intramuskulær (i.m.) eller subcutan (sc.) injektion. Virker omgående ved intravenøs (i.v.) injektion. Virkningsvarighed: 3 -4 timer
		Dosering:	Subcutant og intramuskulært (voksne). 10 mg. Kan gentages, hvis tilstrækkelig effekt udebliver. Intravenøst (voksne): 5 mg (halv ampul) injiceres langsomt. Kan gentages, hvis tilstrækkelig effekt udebliver.
		Bivirkninger:	Svækker vejrtrækningen. Kvalme og opkastning. Hæmmer optagelsen af medikamenter fra mavesækken. Kan give forstoppelse og hæmme blæretømningen.
		Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato, (Morfin, Skanderborg apotek)
		Opbevaring:	Almindelig temperatur. Beskyttes mod lys.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Ved overdosering kan vejrtrækningen ophøre. Modgift: Naloxone (5.1) Denne bivirkning og morfins virkning i øvrigt forstærkes af andre beroligende stoffer som alkohol, sovemidler og lignende. Overdosering er især en risiko ved hurtig injektion. Overdosering sker sjældent ved almindelig dosering. Observer vejrtrækningen og ventilere om nødvendigt med ilt (1.1) på ventilationspose og maske (A.1)

Grp. 3. Smertestillende midler / Analgetics

(continued)

Severe pain Major wounds Injuries Burns Fractures Kidney stone Gall stone Coronary thrombosis (see first aid under 9.1 Glyceryl trinitrate)	3.4	Active pharmaceutical ingredients:	Morphine Δ .
		Form:	Injection liquid, 10 mg/ml, ampoules of 1 ml.
		Effect:	Pain relieving. Gives the patient a feeling of well-being, relaxant. Takes effect after about 5-15 minutes in case of intramuscular or subcutaneous injection. Takes effect immediately in case of intravenous injection Effective for 3-4 hours
		Dosage:	Subcutaneously and intramuscularly (adults): 10 mg. May be repeated if the effect is not sufficient. Intravenously (adults): 5 mg (1/2 ampoule) to be injected slowly. May be repeated if the effect is not sufficient.
		Side-effects:	Restricts breathing. Nausea and vomiting. Restricts the absorption of medicaments from the stomach. May cause constipation and restrict bladder emptying.
		Validity:	2 years from the date of production (Morphine, Skanderborg Pharmacy)
		Storage:	Normal temperature. To be protected from light.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> In case of an overdose, the patient may stop breathing. Antidote: Naloxone (5.1) This side-effect and the effect of morphine as drowsiness may be increased by the use of other sedatives, such as alcohol, sleeping medicine, ect. Risk of overdose primarily if the injection is given too quickly. Overdoses are rare in case of normal dosage. Observe the breathing and if necessary, ventilate by means of oxygen (1.1) ventilations bag and mask (A.1).
Lette til moderate smerter	3.5	Lægemiddelstof:	Tramadol Δ .
		Form:	Kapsel à 50 mg
		Virkning:	Smertestillende
		Dosering:	100 – 200 mg dagligt
		Bivirkninger:	Kvalme, svimmelhed, mundtørhed, opkastning, obstipation. Hovedpine, døsighed, træthed. Øget svedtendens.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato, (Tadol, PharmaCoDane ApS)
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Bør ikke anvendes til gravide.		
Weak to moderate pain	3.5	Active pharmaceutical ingredients:	Tramadol Δ
		Form:	Capsule of 50 mg
		Effect:	Pain relieving
		Dosage:	100-200 mg daily
		Side-effects:	Dizziness, nausea, vomiting, constipation, dry mouth, head ache, drowsiness, fatigue, increased sweating.
		Validity:	5 years from the date of production (Tadol, PharmaCoDane ApS)
		Storage:	Normal temperature
Remarks:	Consult <i>Radio Medial</i> . Should not be used in case of pregnancy.		

Grp. 3. Smertestillende midler / Analgetics

(continued)

Inflammation i huden Gigt Smerter	3.7	Lægemiddelstof:	Diclofenac.
		Form:	Gel 11,6 mg/g
		Virkning:	Smertestillende
		Dosering:	Smøres på huden i et tyndt lag 3-4 gange i døgnet.
		Bivirkninger:	Rødme, hududslæt, hudkløe, eksem, hududslæt ved kontakt med midlet.
		Holdbarhed:	3 år, fra produktionsdato (Voltaren® gel, Novatis Healthcare)
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Må kun anvendes på intakt hud. Må ikke anvendes i ansigtet
Inflammation of the skin. Arthritis Pain.	3.7	Active pharmaceutical ingredients:	Diclofenac
		Form:	Ointment with 11,6 mg/g
		Effect:	Analgesic
		Dosage:	Apply a thin layer to the skin 3-4 times daily
		Side-effects:	Redness, rash, itching, eczema, skin rashes when in contact with the product
		Validity:	3 years from the date of production (Voltaren®gel, Novatis Healthcare A/S)
		Storage:	Normal temperature
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . Only to be used on intact skin. May not be used in the face.
Nyresten Galdesten Ledsmerter	3.8	Lægemiddelstof:	Diclofenac
		Form:	Suppositorier 50 mg
		Virkning:	Smertestilende.
		Dosering:	50 -100 mg mg x 1 dagligt
		Bivirkninger:	Nedsat appetit, sure opstød og halsbrand, kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré, luft i maven. Hovedpine, svimmelhed. Hududslæt og hudkløe.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato, (Voltaren, 2care4)
		Opbevaring:	Almindelig temperatur - ikke over 30 grader
		Anmærkninger:	Søg samråd med Radio Medical. Bør ikke anvendes ved: 1. allergi for acetylsalicylsyre, 2. astmapatienter, 3. patienter i blodfortyndende behandling, 4. patienter med symptomer på mavesår.

Grp. 3. Smertestillende midler / Analgetics**(continued)**

Kidney stone Gall stone Pain in joint	3.8	Active pharmaceutical ingredients:	Diclofenac
		Form:	Suppositorie 50 mg
		Effect:	Analgesic
		Dosage:	50 - 100 mg ones daily
		Side-effects:	Loss of appetite, heartburn and acid regurgitation, nausea and vomiting, abdominal pain, diarrhea, flatulence, headache, dizziness, skin rash, itchy skin.
		Validity:	3 years from the date of production (Voltaren,2care4)
		Storage:	Normal temperature - not above 30 degrees
		Remarks:	Consult Radio Medical. Not to be used in case of: 1. allergy to acetylsalicylic acid, 2. asthma patients, 3. patients in blood diluting treatment, 4. patients with symptoms of ulcer.

Grp. 4. Midler mod allergi, shock og søsyge / Agents for Allergy, Shock and Seasickness

Allergisk shock	4.1	Lægemiddelstof:	Adrenalin.
		Form:	Injektionsvæske 1 mg/ml, ampuller à 1 ml til intramuskulær injektion.
		Virkning:	Øger pulsen, hjertets pumpekraft og blodtrykket. Sammenækning af blodkar. Virker 2 - 5 minutter efter intramuskulær injektion. Omsættes meget hurtigt. Halveringstiden i blodet er 2 - 3 minutter.
		Dosering:	Omgående (voksne): 0,6 mg (godt en halv ampul) dybt intramuskulært. Kan eventuelt gentages, hvis virkningen udebliver.
		Bivirkninger:	Blodtryksstigning, hurtig puls, rysten og svimmelhed.
		Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato (Adrenalin [®] , DAK), hvis opbevaret ved 2-8°C. 6 måneder fra udlevering (Adrenalin [®] , DAK), hvis opbevaret under 25°C
		Opbevaring:	Opbevares køligt og mørkt.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Er livsfarligt at anvende ved shock forårsaget af blod- eller væsketab.
Allergic shock	4.1	Active pharmaceutical ingredients:	Epinephrine.
		Form:	Injection liquid, 1 mg/ml, ampoules of 1 ml for intramuscular injection.
		Effect:	Increases the pulse, the pumping power of the heart, and the blood pressure. Contraction of blood vessels. Takes effect 2-5 minutes after intramuscular injection. Transformed very quickly. The half-life in the blood is 2-3 minutes.
		Dosage:	Immediately (adults): 0.6 mg (about half an ampoule) given deep intramuscular. May be repeated if the effect is insufficient.
		Side-effects:	High blood pressure, rapid pulse, shivering, and dizziness.
		Validity:	2 years from the date of production (Adrenalin [®] , DAK), if stored at 2 °C - 8 °C or 6 months after extradition, if stored less than 25 °C.
		Storage:	To be stored in a cool and dark place.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . Potentialy fatal if used to treat shock caused by loss of blood or fluid.
Allergi Høfeber Nældefeber Allergisk ansigtsødem Allergisk astma	4.2	Lægemiddelstof:	Acrivastin.
		Form:	Kapsler à 8 mg.
		Virkning:	Modvirker allergi. Maksimal virkning efter 1½ - 2 timer. Virkningsvarighed op til 8 timer.
		Dosering:	Voksne: 8 mg efter behov. Maksimalt 3 gange per døgn.
		Bivirkninger:	Døsighed kan forekomme og forstærkes af alkohol og beroligende midler, herunder sovemidler.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Benadryl [®] , McNeil ApS).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Lægemidlet er ikke mærket med ▲ men enkelte personer sløves alligevel så meget, at det er uforsvarligt med vagttjeneste eller maskinbetjening. Ved lungesympotomer: Se tillige gruppe 15.

Grp. 4. Midler mod allergi, shock og søsyge / Agents for Allergy, Shock and Seasickness

(continued)

Allergy Hay fever Urticaria Allergic face oedema Allergic asthma	4.2	Active pharmaceutical ingredients:	Acrivastine.
		Form:	Capsule of 8 mg.
		Effect:	Eases allergic symptoms. Maximum effect after 1.5-2 hours. Effective for up to 8 hours.
		Dosage:	Adults: 8 mg when required. Maximum three times daily
		Side-effects:	Drowsiness may occur and is increased by the use of alcohol and sedatives, including sleeping medicine.
		Validity:	3 years from the date of production (Benadryl®, McNeil Denmark ApS).
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . The medicament is not marked with a Δ , but some patients experience a high degree of drowsiness, making bridge duty and operations of machinery unsafe. In case of symptoms of from the lungs: See group 15.
Allergi Allergisk astma Allergisk ansigtsødem	4.3	Lægemiddelstof:	Hydrocortison.
		Form:	Injektionssubstans 100 mg i to-delt hætteglas med 2 ml sterilt vand til intramuskulært eller intravenøst brug.
		Virkning:	Modvirker allergi og inflammationer. Virkningen indtræder først 4 - 6 timer efter injektion, hvorfor anden akut behandling skal dække dette tidsrum.
		Dosering:	Voksne: 100 mg intramuskulært eller intravenøst som éngangsdosis.
		Bivirkninger:	Ved længere tids anvendelse: Forstyrrelser i sukker, vand- og saltstofskeft og i kirtlernes funktion. Sløring og/eller aktivering af infektioner. Eufori, sindsyge og søvnløshed. Ondt i maven og mavesår.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Solu-Cortef®, Pfizer ApS). Brugsfærdig injektionsvæske holdbart i 72 timer, hvis opbevaret i køleskab.
		Opbevaring:	Almindelig temperatur. Beskyttes mod lys.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Ved lungesympotomer: Se tillige gruppe 15.

Grp. 4. Midler mod allergi, shock og søsyge / Agents for Allergy, Shock and Seasickness

Allergy Allergic asthma Allergic face oedema	4.3	Active pharmaceutical ingredients:	Hydrocortisonsuccinate
		Form:	Injection substance, 100 mg in capped vial divided into two sections, with 2 ml sterile water for intramuscular or intravenous use.
		Effect:	Eases symptoms of allergy and inflammations. Does not take effect until 4-6 hours after the injection. Other acute treatment to cover this period is needed
		Dosage:	Adults: 100 mg given intramuscularly or intravenously as a single dose.
		Side-effects:	If used for a extended period: Disturbances in the sugar, water and salt metabolism and in the glandula functions. Masking and/or activation of infections. Euphoria, mental illness and insomnia. Stomache ache and ulcer.
		Validity:	5 years from the date of production (Solu-Cortef®, Pfizer ApS). Injection liquid ready for use, valid for 72 hours, if stored cold.
		Storage:	Normal temperature. To be kept out of daylight. Injection liquid ready for use, to be stored refrigeated.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . In case of symptoms from lungs See also group 15.
Søsyge	4.5	Lægemiddelstof:	Cinnarizin Δ .
		Form:	Tablet à 25 mg.
		Virkning:	Modvirker søsyge.
		Dosering:	25 mg en ½ time før effekt ønskes. Efter behov kan derefter tages 12,5 mg hver 6. time.
		Bivirkninger:	Døsighed
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Sepan®, Paranova Danmark A/S).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
Anmærkninger:	Må ikke gives til patienter med grøn stær eller vandladningsbesvær (forstørret prostata).		
Seasickness	4.5	Active pharmaceutical ingredients:	Cinnarizine Δ .
		Form:	Tablets of 25 mg
		Effect:	Prevent seasickness. Effect after 30 minutes
		Dosage:	25 mg ½hour before desired effect. If needed, 12,5 mg may be given subsequently
		Side-effects:	Drowsiness.
		Validity:	5 years from the date of production (Sepan®, Paranova Danmark A/S)
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Do not administer to patients with glaucoma or urinating problems (enlarged prostate)

Grp. 5. Antidoter / Antidotes

<p>Modgift ved overdosering af morfin</p> <p>Førstehjælp: Ved udsættende vejtrækning understøttes manuelt med ilt på ballon og maske 15 l ilt/minut.</p>	5.1	Lægemiddelstof:	Naloxon.
		Form:	Injektionsvæske 0,4 mg/ml, ampuller à 1 ml til intramuskulær injektion.
		Virkning:	Naloxon ophæver morfins (bi)virkning. Virker 2 - 3 minutter efter intramuskulær injektion. Virkningsvarighed: Op til 4 timer.
		Dosering:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naloxon voksne: Der gives omgående 0,8 mg (2 ampuller) intramuskulært. 2. Hvis virkningen udebliver kan behandlingen gentages efter 5 minutter.
		Bivirkninger:	Rysten, utilpashed og opkastninger (abstinenssymptomer).
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Naloxon, B. Braun).
		Opbevaring:	Beskyttes mod lys.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
<p>Antidote to be administered in case of an overdose of morphine</p> <p>First Aid: If the patient stops breathing, assist breathing manually with oxygen 15l/minute on a mask.</p>	5.1	Active pharmaceutical ingredients:	Naloxone.
		Form:	Injection liquid, 0.4 mg/ml, ampoules of 1 ml for intramuscular injection.
		Effect:	Naloxone counteracts the (side)-effects of morphine. Takes effect 2-3 minutes after intramuscular injection. Effective for up to 4 hours.
		Dosage:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naloxone adults: 0.8 mg (2 ampoules) is given immediately intramuscular. 2. In case of no effect, the treatment may be repeated after 5 minutes.
		Side-effects:	Shivering, feeling unwell, and vomiting.
		Validity:	3 years from the date of production (Naloxon B. Braun).
		Storage:	To be protected from daylight.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> .

Grp. 5. Antidoter / Antidotes

(continued)

Insulintilfælde Insulinshock Lavt blodsukker	5.2	Lægemiddelstof:	Glucagon.
		Form:	Ready-set bestående af: Injektionssubstans Glucagon 1 mg i hætteglas og sprøjte med 1 ml sterilt vand til intramuskulært brug.
		Virkning:	Frigør sukkerreserver fra leveren. Virker normalt inden 5 - 10 minutter. Virkningsvarighed: 10 - 40 minutter.
		Dosering:	Voksne: 1 mg intramuskulært. Kan evt. gentages efter 10 - 15 minutter. Når patienten er kommet til bevidsthed gives brød og sød saft.
		Bivirkninger:	Kvalme og opkastninger kan forekomme. Kan udløse hjertekrampe hos hjertesygge. Hjertekrampe behandles med glycerylnitrat spray (9.1).
		Holdbarhed:	Ved almindelig temperatur: 18 måneder fra produktionsdato (GlucaGen® HypoKit, Novo Nordisk). Ved 2 - 8° C: 36 måneder fra produktionsdato. Den blandede opløsning skal anvendes umiddelbart.
		Opbevaring:	Almindelig temperatur eller 2 - 8° C. (GlucaGen® HypoKit, Novo Nordisk).
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Dersom den blandede opløsning er uklar eller med krystaller, må blandingen ikke anvendes.
Hypoglycaemic coma Insulin shock Low blood sugar	5.2	Active pharmaceutical ingredients:	Glucagon.
		Form:	Ready-set consisting of: Injection substance Glucagon, 1 mg in a capped vial and a syringe with 1 ml of sterile water for intramuscular use.
		Effect:	Releases sugar reserves from the liver. Normally, takes effect within 5-10 minutes. Effective for 10-40 minutes.
		Dosage:	Adults: 1 mg intramuscularly. May be repeated after 10-15 minutes. When the patient regains consciousness, he is given some bread and sweet juice.
		Side-effects:	Nausea and vomiting may occur. May cause angina pectoris in people with heart diseases. Angina pectoris is treated with glyceryl trinitrate spray (9.1).
		Validity:	At room temperature: 18 months from the date of production (GlucaGen® HypoKit, Novo Nordisk). At 2-8°C: 36 months from the date of production. The mixed dissolution must be used immediately.
		Storage:	Normal temperature or 2-8° C. (GlucaGen® HypoKit, Novo Nordisk).
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . If the mixed dissolution is cloudy or contains crystals, it must not be used.

Grp. 6. Midler mod psykiske lidelser og kramper / Mental disorder and Convulsion

Angst og urotilstande Alkoholabstinenser Forebyggelse af kramper Ledskred og brud 1. valgspræparat ved akut sindsyge (alternativt anvendes klysma (6.3))	6.2	Lægemiddelstof:	Diazepam Δ .
		Form:	Tabletter à 5 mg.
		Virkning:	Stærkt sløvende og muskelafslappende. Dæmper angst, uro og rastløshed. Virker efter 30 minutter. Udskilles meget langsomt (Halveringstid: 20 - 50 timer). Forstærker virkningen af morfin, haloperidol, alkohol og andre sløvende medikamenter.
		Dosering:	5 mg x 3 dagligt. Akut sindsyge: Dosis efter aftale med <i>Radio Medical</i> . Se også 6.4.
		Bivirkninger:	Vanedannende. Døsighed, svimmelhed, forvirring, hukommelsessvigt og balanceforstyrrelser.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Diazepam, Nycomed Danmark).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Anxiety and states of restlessness Alcoholic withdrawal symptoms Prevention of convulsions Dislocations and fractures First choice of medicament in case of acute mental disease (alternatively, Enema (6.3) are used.)	6.2	Active pharmaceutical ingredients:	Diazepam Δ
		Form:	Tablets of 5 mg.
		Effect:	Strongly sedative and muscle-relaxant. Decreases anxiety and restlessness. Takes effect after 30 minutes. Is excreted very slowly (half-life: 20-50 hours). Increases the effect of morphine, haloperidole, alcohol and other sedatives.
		Dosage:	5 mg three times daily Acute mental disease: Dosage after consultation with Radio Medical. See also 6.4.
		Side-effects:	Addictive. Drowsiness, dizziness, confusion, lapse of memory, and balance disturbances.
		Validity:	5 years from the date of production (Diazepam, Nycomed Danmark).
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> .
Universelle kramper Kramper fra forgiftninger Abstinenskramper Epilepsi Akut sindsyge	6.3	Lægemiddelstof:	Diazepam Δ .
		Form:	Klysma, 4 mg/ml, til anvendelse i endetarmen
		Virkning:	Stærkt sløvende og muskelafslappende. Dæmper angst, uro og rastløshed. Virker 5 - 10 minutter efter rektal administration. Udskilles meget langsomt (Halveringstid: 20 - 50 timer). Forstærker virkningen af morfin, haloperidol, alkohol og andre sløvende medikamenter.
		Dosering:	Efter aftale med Radio Medical - 1 klysma tømmes ind i endetarmen.
		Bivirkninger:	Døsighed, svimmelhed, forvirring, hukommelsessvigt og balanceforstyrrelser.
		Holdbarhed:	2,5 år fra produktionsdato (Stesolid [®] , Actavis A/S). Dog maksimalt 1 år efter anbrud af aluminiumsposen..
		Opbevaring:	Almindelig temperatur..
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i>

Grp. 6. Midler mod psykiske lidelser og kramper / Mental disorder and Convulsion (continued)

Universal convulsions Convulsions caused by poisoning Withdrawal convulsions Epilepsy Acute mental illness	6.3	Active pharmaceutical ingredients:	Diazepam.Δ
		Form:	Enema, 4 mg /ml, for insertion into the rectum.
		Effect:	Strong sedative and muscle-relaxant. Decreases anxiety and restlessness. Takes effect 5-10 minutes after rectal administration. Is excreted very slowly (half-life: 20-50 hours). Increases the effect of morphine, haloperidole, alcohol and other sedatives.
		Dosage:	After consult of Radio Medical - 1 enema is emptied into the rectum.
		Side-effects:	Drowsiness, dizziness, confusion, lapse of memory, and balance disturbances.
		Validity:	2,5 years from the date of production (Stesolid®, Actavis A/ S). However, maximum 1 year after having opened the aluminiumbag.
		Storage:	Normal temperature
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> .
2. valgspræparat ved akut sindsyge præget af mani, vildskab, psykisk og Motorisk uro, angst, vrangforestillinger og hallucinationer. Kvalme og opkastninger	6.4	Lægemiddelstof:	Haloperidol Δ.
		Form:	Injektionsvæske 5 mg/ml, ampuller à 1 ml til intramuskulær injektion.
		Virkning:	Afdæmper symptomerne ved sindsygen. Dæmper kvalme og opkastninger.
		Dosering:	Akut sindsyge: 5 - 10 mg intramuskulært. Kan eventuelt gentages 3 eller flere gange dagligt. Behandlingen kan eventuelt forstærkes med diazepam (6.2/ 6.3).
		Bivirkninger:	Den sløvende effekt forstærkes af alkohol, morfin og andre sløvende midler.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Serenase®, Janssen-Cilag).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Second choice of medicament in case of acute mental illness characterized by mania, wildness, mental and motoric restlessness, anxiety, delusions, and hallucinations. Nausea and vomiting	6.4	Active pharmaceutical ingredients:	Haloperidole. Δ.
		Form:	Injection liquid 5 mg/ml, ampoules of 1 ml for intramuscular injection.
		Effect:	Restricts the symptoms of mental disease. Reduces nausea and vomiting.
		Dosage:	Acute mental disease: 5-10 mg intramuscularly. May be repeated three times daily or more. The treatment may be enhanced by the use of diazepam (6.2/6.3).
		Side-effects:	The sedative effect is increased by alcohol, morphine, and other sedatives.
		Validity:	5 years from the date of production (Serenase®, Janssen-Cilag).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult Radio Medical.

Grp. 6. Midler mod psykiske lidelser og kramper / Mental disorder and Convulsion (continued)

Søvnløshed Indsovningsbesvær	6.5	Lægemiddelstof:	Zolpidem Δ .
		Form:	Tabletter à 10 mg.
		Virkning:	Stærkt sløvende Virker hurtigt efter indtagelse Virkningen varer op til 6 timer Virkningen forstærkes af andre sløvende stoffer, herunder alkohol
		Dosering:	Voksne. 10 mg 15-30 min. før sengetid.
		Bivirkninger:	Kvalme, opkastning, diarré. Hovedpine, koncentrationsbesvær, konfusion, hukommelsesbesvær, svimmelhed, døsigthed, hudreaktioner, dobbeltsyn.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Zolpidem Hexal A/S).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Insomnia Difficulty falling asleep	6.5	Active pharmaceutical ingredients:	Zolpidem Δ
		Form:	Tablets of 10 mg
		Effect:	Strong sedative, rapid effect after ingestion, Effective up till 6 hours. The effect is increased by the use of other sedatives, including alcohol
		Dosage:	Adults. 10 mg 15-30 minutes. before bedtime.
		Side-effects:	Nausea, vomiting, diarrhea. Headache, difficulty concentrating, confusion, memory loss, dizziness, drowsiness, skin reactions, double vision
		Validity:	5 years from the date of production (Zolpidem Hexal A/S)
		Storage:	Normal temperature
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> .

Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections

Halsbetændelse Mundhuleinfektioner Bihulebetændelse Mellemøre- betændelse Lungebetændelse	7.1	Lægemiddelstof:	Phenoxymethylpenicillin
		Form:	Tabletter à 660 - 800 mg (ca.1 mill. IE)
		Virkning:	Dræber de hyppigst forekommende bakterier, der forårsager infektioner i luftvejene
		Dosering:	400-800 mg × 2 – 4 dagligt
		Bivirkninger:	Kvalme, diarré og hududslæt. Sjældent ses overfølsomhedsshock
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Primicillin®, MEDA)
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Overfølsomhedsshock optræder meget sjældent, og som regel senest 30 minutter efter indgift. Behandling: Adrenalin 0.6 mg intramuskulært (4.1)
Inflammation of the throat Infections of the oral cavity Sinusitis Inflammation of the middle ear Pneumonia	7.1	Active pharmaceutical ingredients:	Phenoxymethylpenicillin.
		Form:	Tablets of 660 - 800 mg (approx. 1 MIU)
		Effect:	Kills the most common bacteria causing infections of the respiratory tract.
		Dosage:	400-800 mg × 2-4 times daily
		Side-effects:	Vomiting, diarrhoea and rash. Rarely allergic shock
		Validity:	3 years from the date of production (Primicillin®, MEDA)
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . Allergic shock is very rare and usually occurs within 30 minutes after administration. Treatment: Adrenaline 0.6mg intramuscular.(4.1)

Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections (continued)

Halsbetændelse Mundhuleinfektioner Bihulebetændelse Mellemsørebetændelse Lungebetændelse Legionella Chlamydia infektioner Mavesårsinfektioner Alternativ til penicillin ved allergi	7.4	Lægemiddelstof:	Erythromycin.
		Form:	Tabletter à 500 mg.
		Virkning:	Standser bakteriernes vækst.
		Dosering:	250 - 500 mg x 2 - 4 dagligt. Ved alvorlig infektion kan dosis øges til 4 g per døgn. Tabletter gives umiddelbart før måltid. (Enterotabletter gives senest en time før måltid eller tidligst 2 timer efter).
		Bivirkninger:	Madlede, kvalme, mavekneb og forbigående diaré.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Abbotycin, Amdipharm Limited).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Inflammation of the throat Infections of the oral cavity Sinusitis Inflammation of the middle ear Pneumonia Legionella Chlamydia infections Infections in connection with ulcer Alternative to penicillin in case of allergy	7.4	Active pharmaceutical ingredients:	Erythromycin.
		Form:	Tablets of 500 mg.
		Effect:	Stops bacterial growth.
		Dosage:	250-500 mg two-four times daily case of a serious infection, the dose may be increased to 4 g a day. Tablets are given immediately before a meal. (Enterotablets are given 1 hour before a meal at the latest or 2 hours after a meal at the earliest).
		Side-effects:	Loss of appetite, nausea, stomach cramp, or transient diarrhoea.
		Validity:	5 years from the date of production (Abbotycin, Amdipharm Limited).
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> .
HalsbyldTandbyld Knogleinfektion Underlivsinfektioner Tarminfektioner Blindtarmsbetændelse (tjek urinstiks G.1)	7.6	Lægemiddelstof:	Metronidazol.
		Form:	Tablet à 500 mg.
		Virkning:	Bakteriedræbende.
		Dosering:	500 mg x 3 dagligt.
		Bivirkninger:	Mavekneb, smagsforstyrrelser, hovedpine, hududslet og svimmelhed. Urinen kan blive farvet mørk. Kan virke som antabus ved samtidig indtagelse af alkohol.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Metronidazol, Actavis).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Bør ikke anvendes til gravide. Anvendes ofte i kombination med andre antibiotika, f.eks. Ciprofloxacin (7.8) eller Ceftriaxon (7.9) Må ikke anvendes sammen med 15.1 Dextromethorphan.

Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections (continued)

Boil in the throat Tooth abscess Bone infection Infection of female reproductions organs Abdominal infections Intestinal infections Appendicitis (Check dipstick G.1)	7.6	Active pharmaceutical ingredients:	Metronidazole.
		Form:	Tablet of 500 mg.
		Effect:	Kills bacteria.
		Dosage:	500 mg three times daily
		Side-effects:	Bellyache, altered sense of taste, headache, rash, and dizziness. The urine may be coloured black. May cause a reaction similar to that caused by Antabuse in connection with alcohol.
		Validity:	5 years from the date of production (Metronidazol, Actavis).
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . Should not be given to pregnant patients. Often used in combination with other antibiotics, e.g. Ciprofloxacin (7.8) or Ceftriaxon (7.9). May not be used with 15.1 Dextromethorphan.
Halsbyld Tandbyld Knogleinfektion Underlivsinfektioner Tarminfektioner Blindtarmsbetændelse	7.7	Lægemiddelstof:	Metronidazol.
		Form:	Stikpille à 500 mg
		Virkning:	Bakteriedræbende.
		Dosering:	500 mg x 3 daglig
		Bivirkninger:	Kvalme, opkastning, mavesmerter, diaré, forstoppelse, og smagsforstyrrelse. Mørkfarvet urin. Kan virke som antabus ved samtidig indtagelse af alkohol.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Flagyl®, Sanofi-aventis)
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Kan om nødvendigt anvendes, til gravide. Anvendes ofte i kombination med andre antibiotika, fx Ciprofloxacin (7.8) eller Ceftriaxon (7.9). Må ikke anvendes sammen med 15.1 Dexofan.
Boil in the throat Tooth abscess Bone infection Infection of female reproductions organs Abdominal infections Intestinal infections Appendicitis (Check dipstick G.1)	7.7	Active pharmaceutical ingredients:	Metronidazol.
		Form:	Suppository of 500 mg
		Effect:	Kills bacteria.
		Dosage:	500 mg three times daily
		Side-effects:	Nausea vomiting, abdominal pain, diarrhea, constipation, and taste disturbance. Dark colored urine. May cause a reaction similar to Antabuse in connection with alcohol.
		Validity:	3 years from productions date (Flagyl®, Sanofi-aventis Denmark A/ S)
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . May be used during pregnancy, if nessasary. Often used in combination with other antibiotics e.g. Ciprofloxacin (7.8) or Ceftriaxon (7.9). May not be used with 15.1 Dextromethorphan

Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections (continued)

Tandbyld Halsbyld Svær bronkitis Lungepest Akut diarré Kolera Dysenteri Blindtarmsbetændelse Gonoré Urinrørsbetændelse Nyrebækkenbetændelse (tjek u	7.8	Lægemiddelstof:	Ciprofloxacin.
		Form:	Tabletter à 250 mg.
		Virkning:	Dræber bakterier.
		Dosering:	250 - 750 mg x 2 dagligt.
		Bivirkninger:	Mavekneb, kvalme, opkastninger, madlede, hovedpine, svimmelhed, træthed og kramper, muskel-, led- og seneømhed, allergi, overfølsomhedsreaktion ved samtidig udsættelse for sollys.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Cifin, PharmaCoDane ApS).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med Radio Medical. Gives ved mange infektioner i kombination med metronidazol (7.6 eller 7.7). Må ikke gives til gravide eller ammende.
Boil in the throat Tooth abscess Severe bronchitis Pneumonic plague Acute diarrhoea Cholera Dysentery Appendicitis Gonorrhoea Urethritis Pyelitis (Check dipstick G.1)	7.8	Active pharmaceutical ingredients:	Ciprofloxacin.
		Form:	Tablets of 250 mg.
		Effect:	Kills bacteria.
		Dosage:	250-750 mg twice daily The tablets are given 1 hour before a meal at the latest or 2 hours after a meal at the earliest.
		Side-effects:	Bellyache, nausea, vomiting, loss of appetite, headache, dizziness, fatigue, and convulsions. Soreness in the muscles, joints and tendons. Allergy. Allergic reaction in case of simultaneous exposure to sunlight.
		Validity:	5 years from the date of production (Cifin, PharmaCoDane Aps).
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult Radio Medical. Is given in combination with metronidazole (7.6 or 7.7) in connection with many infections. Should not be given to pregnant or breast-feeding patients.

Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections (continued)

Blodforgiftning Sepsis Meningitis Lungebetændelse Blindtarmsbetændelse Nyrebækkenbetændelse Store sårskader Åbne knoglebrud	7.9	Lægemiddelstof:	Ceftriaxon.
		Form:	Injektionssubstans, 1 g tørstof i hætteglas + 10 ml sterilt vand i hætteglas til intravenøst brug. Kan gives intramuskulært - Kontakt Radio Medical
		Virkning:	Bakteriedræbende.
		Dosering:	1 - 2 g intravenøst i døgnet i én dosis.
		Bivirkninger:	Allergiske reaktioner: Hududslet, nældefeber, ledsmerter, overfølsomhedsshock.
		Holdbarhed:	Injektionssubstans: 3 år fra produktionsdato (Rocephalin®, Roche). Brugsfærdig opløsning: 24 timer i køleskab.
		Opbevaring:	Må ikke opbevares over 30°C.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Gives ved mange infektioner i kombination med metronidazol (7.6 eller 7.7). Er stærkt vævsirriterende ved intramuskulær injektion.
Sepsis Blood poisoning Meningitis Pneumonia Appendicitis Pyelitis Major wounds Open fractures	7.9	Active pharmaceutical ingredients:	Ceftriaxone.
		Form:	Injection substance, 1 g of dry substance in a capped vial + 10 ml of sterile water in a capped vial for intravenous use. Can be given intramuscular - Contact Radio Medical
		Effect:	Kills bacteria.
		Dosage:	1-2 g intravenously daily as a single dose.
		Side-effects:	Allergic reactions: Rash, urticaria, arthralgia, allergic shock.
		Validity:	Injection substance: 3 years from the date of production (Rocephaline®, Roche). Dissolution ready for use: 24 hours, if refrigerated.
		Storage:	Not to be stored at more than 30°C.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . Often used in combination with metronidazole (7.6 or 7.7) in connection with many infections. In case of intramuscular injection, strong irritation of tissue.
Stivkrampevaccine Gives ved ulykker med kvæstelser og sår, med mindre den skadede med sikkerhed er dækket med stivkrampevaccine. Vaccinen suppleres med tetanus immunglobulin (se 7.11). Vaccination skal ske i behandlingsrum med adgang til adrenalin og genoplivningsudstyr.	7.10	Lægemiddelstof:	Tetanus holdig vaccine (tetanustoxoid).
		Form:	Injektionsvæske
		Virkning:	Aktiverer patientens immunsystem.
		Dosering:	Følg ordination fra Radio Medical
		Bivirkninger:	Lokal rødme, hævelse og ømhed. Hovedpine, utilpashed og feber ses undertiden og fortager sig efter et døgn. Ledsmerter og hævede, ømme lymfeknuder kan ses på 8. dag. Allergisk shock forekommer sjældent.
		Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato (Tetanusvaccine SSI).
		Opbevaring:	Opbevares køligt mellem 2 - 8° C. Frossen vaccine må ikke anvendes.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Overfølsomhedsshock optræder sjældent. Behandling: Adrenalin 0,6 mg intramuskulært (4.1).

Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections			(continued)
<p>Tetanus vaccine</p> <p>To be administered in case of accidents causing injury and wounds unless the wounded person is for certain covered by a tetanus vaccine.</p> <p>The vaccine is to be supplemented by tetanus immune globulin (see 7.11).</p> <p>The vaccination must be given in a room with access to 4.1 Adrenaline and A.1 Resuscitation equipment.</p>	7.10	Active pharmaceutical ingredients:	Vaccine containing Tetanus (tetanustoxoid).
		Form:	Injection liquid
		Effect:	Activates the patient's immune system.
		Dosage:	Follow prescription from Radio Medical
		Side-effects:	Local blushing, swelling, and soreness. Headache, weak general condition, and fever are sometimes seen, which decrease after about 1 day. Arthralgia and swollen, sore lymph nodes may be seen on the eighth day.
		Validity:	2 years from the date of production (Tetanus vaccine SSI).
		Storage:	To be stored cool at between 2-8°C. Frozen vaccine must not be used.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> .
<p>Stivkrampemodgift</p> <p>Gives ved ulykker med kvæstelser og sår, med mindre den skadede med sikkerhed er dækket med stivkrampe-vaccine.</p> <p>Tetanus immunoglobulin suppleres med vaccine (se 7.10).</p> <p>Behandlingen skal ske i behandlingsrum med adgang til 4.1 Adrenalin og A.1 Genoplivningsudstyr.</p>	7.11	Lægemiddelstof:	Humant tetanus immunoglobulin.
		Form:	Injektionsvæske 250 I.E. Ampul à 1 ml til intramuskulær injektion.
		Virkning:	Bekæmper giftstoffer produceret af stivkrampebakterien.
		Dosering:	1 injektion à 250 I.E. (1 ml) intramuskulært. Suppleres med tetanusvaccine (se 7.10).
		Bivirkninger:	Lokal rødme, hævelse, ømhed og feber ses undertiden. Allergisk shock og andre allergiske reaktioner forekommer, men sjældent.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Tetagam® P/Tetanogamma® P, Centeon).
		Opbevaring:	Opbevares køligt mellem 2 - 8° C. Frossen immunoglobulin må ikke anvendes. Må ikke anvendes, hvis væsken fremstår uklar eller klumpet.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Overfølsomhedsskock optræder sjældent. Behandling: Adrenalin 0,6 mg intramuskulært (4.1).
<p>Tetanus antidote</p> <p>To be administered in case of accidents causing injury and wounds unless the wounded person is for certain covered by a tetanus vaccine.</p> <p>Tetanus immune globulin is to be supplemented by a vaccine (see 7.10).</p> <p>The treatment must be given in a room with access to 4.1 Adrenaline and A.1 Resuscitation equipment.</p>	7.11	Active pharmaceutical ingredients:	Human tetanus immunoglobulin.
		Form:	Injection liquid 250 IU. Ampoule of 1 ml for intramuscular injection.
		Effect:	Combats poisonous substances produced by the tetanus bacteria.
		Dosage:	1 injection of 250 IU (1 ml) given intramuscularly. To be supplemented by the tetanus vaccine (see 7.10).
		Side-effects:	Local blushing, swollenness, soreness, and fever are sometimes seen.
		Validity:	3 years from the date of production (Tetagam® P/ Tetanogamma® P, CSL Behring).
		Storage:	To be stored cool at between 2-8°C. Frozen immune globulin must not be used. Not to be used if the liquid is muddy or lumpy.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> .

Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections		(continued)	
Infektioner forårsaget af stafylokokker. Knogleinfektion	7.12	Lægemiddelstof:	Flucloxacillin
		Form:	Tablet à 500 mg
		Virkning:	Bakteriedræbende
		Dosering:	750 - 1000 mg 3-4 gange dagligt
		Bivirkninger:	Kvalme, opkastning, diarré, hududslæt.
		Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato. Åbne blisterpakninger 6 måneder (Heracillin, Meda AS)
		Opbevaring:	Almindelig temperatur
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Infections caused by staphylococci. Infections in the bones	7.12	Active pharmaceutical ingredients:	Flucloxacillin
		Form:	Tablets of 500 mg
		Effect:	Kills bacteria
		Dosage:	750-1000 mg 3-4 times daily
		Side-effects:	Nausea, vomiting, diarrhea, skin rash
		Validity:	2 years from the date of production. 6 months for open blister pack(Heracillin, Meda AS)
		Storage:	Normal temperature
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> .
Urinvejsinfektioner Lungebetændelse	7.13	Lægemiddelstof:	Sulfamethoxazol+trimitroprim
		Form:	Tablet à 400 mg+80 mg
		Virkning:	Bakteriedræbende
		Dosering:	2 tabletter 2 gange dagligt
		Bivirkninger:	Feber. Betændelse på tungen, kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré, hudkløe, hududslæt.
		Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato. (Sulfamethoxazol+trimitropin, Skanderborg Apotek)
		Opbevaring:	Almindelig temperatur
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Bør ikke anvendes til gravide.
Urinary tract infection Pneumonia	7.13	Active pharmaceutical ingredients:	Sulfamethoxazole+trimitroprim
		Form:	Tablets of 400 mg + 80 mg
		Effect:	Kills bacteria
		Dosage:	2 tablets twice daily
		Side-effects:	Fever. Inflammation of the tongue, nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea, pruritus, rash
		Validity:	2 years from the date of production (Sulfamethoxazol+trimitropin, Skanderborg Pharmacy)
		Storage:	Normal temperature
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . Should not be used during pregnancy

Grp. 8. Malaria – forebyggelse / Malaria – Prevention

Forebyggelse af malaria	8.1	Lægemiddelstof:	Atovaquon/Proguanil (Malarone®).
		Form:	Tabletter à 250/100 mg.
		Virkning:	Forebygger malaria.
		Dosering:	Tabletterne skal indtages med fedtholdigt mad (mælk/smør). Forebyggelse fra 1 dag før ankomst til 7 dage efter afrejse fra malariaområdet. Dosis voksne: 1 tablet dagligt.
		Bivirkninger:	Hovedpine, mavekneb, kvalme, opkastning, appetitløshed, diaré, hoste og allergisk hududslet. Ved opkastning inden én time efter indtagelse af medikamentet indtages ny tablet.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Malarone®, GlaxoSmithKline Pharma A/S).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Forebyggelse: Se Søfartsstyrelsens gældende vejledning om Malaria.
Prevention of malaria	8.1	Active pharmaceutical ingredients:	Atovaquone/Proguanil (Malarone®).
		Form:	Tablets of 250/100 mg.
		Effect:	Prevents malaria.
		Dosage:	The tablets <i>must</i> be taken with fatty food (milk/butter). The prevention starts 1 day before arrival and lasts until 7 days after departure from the malaria area. Dose, adults: 1 tablet a day.
		Side-effects:	Headache, stomach pains, nausea, vomiting, loss of appetite, diarrhoea, coughing and allergic rash. If the patient vomits within 1 hour after have taken the medicament, a new tablet has to be consumed.
		Validity:	5 years from the date of production (Malarone®, GlaxoSmithKline Pharma A/S).
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Primary prevention of malaria: See the Danish Maritime Authority's guide on Malaria.
Forebyggelse af malaria Anvendes til forebyggelse, dersom man ikke tåler 8.1 Anvendes sommetider i kombination med 8.3 til behandling.	8.2	Lægemiddelstof:	Doxycyklin.
		Form:	Tablets 100 mg
		Virkning:	Forebygger malaria.
		Dosering:	Dosis voksne og børn over 12 år: 1 tablet dagligt. Indtages med et glas vand eller et let måltid uden mælkeprodukter. Behandlingen udstrækkes fra 1 dag før ankomst til 4 uger efter afrejse fra malariaområdet.
		Bivirkninger:	Kvalme, vaginal svamp og toksiske hudreaktioner i forbindelse med sollys.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Vibradox®, Sandoz)
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med Radio Medical. Må ikke anvendes af gravide eller ammende eller af børn under 12 år. Direkte sollys bør undgås. Interaktion med mange lægemidler.

Grp. 8. Malaria – forebyggelse / Malaria – Prevention

(continued)

<p>Prevention of malaria</p> <p>To be used for prevention if 8.1 is not tolerated</p> <p>Some times used in combination with 8.3 for treatment</p>	8.2	Active pharmaceutical ingredients:	Doxycycline.
		Form:	Tablets of 100 mg.
		Effect:	Prevents malaria.
		Dosage:	To be taken with a glass of water or a light meal without any milk products. The prevention starts 1 day before arrival and lasts until 4 weeks after departure from the malaria area. Dose, adult and children over the age of 12 or 45 kg: 1 tablet daily
		Side-effects:	Nausea, vaginal candidiasis, toxic skin reaction in connection with sunlight.
		Validity:	5 years from the date of production (vibradox®, Sandoz)
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> Not to be used by pregnant or breast-feeding woman or children below the age of 12. Direct sunlight should be avoided. Interaction with many other medicines.

Grp. 8. Malaria – behandling / Malaria – Treatment

<p>Førstevalgspræparat til behandling af ukompliceret malaria på betingelse af, at Atovaquon/Proguanil ikke blev indtaget som forebyggende middel. Positiv malaria test eller almen sygdomsfornemmelse og feber kombineret med relevant risiko for malaria</p>	8.1	Lægemiddelstof:	Atovaquon/Proguanil
		Form:	Tabletter à 250/100 mg.
		Virkning:	Hæmmer celledelingen af malariaparasiteri leveren.
		Dosering:	Tabletterne skal indtages med fedtholdigt mad (mælk/smør). Dosis voksne: 4 tabletter x 1 dagligt i 3 dage
		Bivirkninger:	Hovedpine, mavekneb, kvalme, opkastning, appetitløshed, diaré, hoste og allergisk hududslet. Ved opkastning inden én time efter indtagelse af medikamentet indtages ny tablet.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Malarone®, GlaxoSmithKline Pharma A/S).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med Radio Medical uanset resultatet af malariatesten. Patientens almen tilstand skal bedres og temperaturen blive normal efter 2 – 3 dages behandling. I modsat fald kan man i samråd med Radio Medical fortsætte med 8.3.
<p>First choice of medicament for treatment of uncomplicated malaria on the condition that Atovaquon/Proguanil has not been taken as a preventive medicament. Positive Malaria test or general feeling of being ill and fever combined with a relevant risk of malaria</p>	8.1	Active pharmaceutical ingredients:	Atovaquon/Proguanil
		Form:	Tablets of 250/100 mg.
		Effect:	Inhibits the proliferation of the malaria parasite in the liver
		Dosage:	The tablets must be taken with fatty food (milk / butter). Dose, adult 4 tablets daily for 3 days.
		Side-effects:	Headache, slight stomach pains, nausea, vomiting, loss of appetite, diarrhoea, and coughing. If the patient vomits within 1 hour after having taken the medicament, the treatment is repeated.
		Validity:	5 years from the date of production (Malarone®, GlaxoSmithKline Pharma A/S).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult Radio Medical. The patient should be recovering after 2-3 days treatment. If this is not the case, proceed with 8.3 after having consulted Radio Medical.

Grp. 8. Malaria – behandling / Malaria – Treatment

(continued)

<p>Førstevalgspræparat til behandling af malaria: hvis Malarone® blev indtaget som forebyggende middel</p> <p>Andetvalgspræparat ved behandlingssvigt af Malarone®</p>	8.3	Lægemiddelstof:	Quinin.
		Form:	Tabletter à 100 mg.
		Virkning:	Hæmmer celledelingen af malariaparasiten.
		Dosering:	10 mg per kg legemsvægt x 3 dagligt i 7 dage
		Bivirkninger:	Øresusen, synsforstyrrelser, kvalme, opkastning og svimmelhed ses hyppigt. Ved opkastning inden én time efter indtagelse af medikamentet gentages behandlingen.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Kinin "DAK", Nycomed Danmark).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> uanset resultatet af malariatesten. Patientens almen tilstand skal bedres og temperaturen blive normal efter 2 – 3 dages behandling.
<p>First choice of medicament for treatment of malaria: if Malarone® has been taken as a preventive medicament</p> <p>Second choice of medicament in case of failed treatment with Malarone®</p>	8.3	Active pharmaceutical ingredients:	Quinine.
		Form:	Tablets of 100 mg.
		Effect:	Inhibits the proliferation of the malaria parasite
		Dosage:	10 mg per kg bodyweight three times daily for 7 days
		Side-effects:	Buzzing in the ears, visual disturbances, nausea, vomiting, and dizziness are often seen. If the patient vomits within 1 hour after having taken the medicament, the treatment is repeated.
		Validity:	5 years from the date of production (Kinin "DAK", Nycomed Denmark).
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> regardless of the result of the malaria test. The patient should be recovering and the temperature become normal after 2-3 days treatment.

Grp. 9. Hjertemedicin / Cardiac Medicine

<p>Hjertekrampe Smerter i hjertet Blodprop i hjertet</p> <p>Førstehjælp: Hjertestilling (eleveret overkrop) 2 - 3 l ilt/minut Glycerylnitrat (9.1) Acetylsalicylsyre (9.3)</p> <p>Evt. for smerter: Morfin (3.4) / Tramadol (3.5)</p>	9.1	Lægemiddelstof:	Glycerylnitrat
		Form:	Mundhule spray med 0,4 mg/dosis.
		Virkning:	Udvider blodkar. Virker inden 1 minut. Virkningsvarighed: 10 - 30 minutter.
		Dosering:	Medikamentet pustes ind under tungen eller på kindens inderside. 1 pust så hurtigt som muligt efter smerters opståen. Kan gentages 1 gang. Hvis smerterne ikke fortager sig, suppleres med morfin (3.4).
		Bivirkninger:	Ansigtserødem, hovedpine og kvalme. Kan sænke blodtrykket lidt.
		Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato (Glytrin®, Meda).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur. Beskyttes mod frost, direkte varme og sollys.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Overvåg blodtrykket, som helst ikke må komme under 90 mm Hg systolisk. Må ikke anvendes i nærheden af åben ild eller gløder.
<p>Angina pectoris Heart pain Coronary thrombosis</p> <p>First aid: Sit up in comfortable position 2-3 l oxygen/minute Glyceryl trinitrate (9.1) Acetylsalicylic acid (9.3)</p> <p>Possibly against pain: Morfin (3.4) / Tramadol (3.5)</p>	9.1	Active pharmaceutical ingredients:	Glyceryl trinitrate.
		Form:	Oral cavity spray with 0.4 mg/dose.
		Effect:	Expands the blood vessels. Takes effect within 1 minute. Effective for 10-30 minutes.
		Dosage:	The medicament is sprayed under the tongue or at the inner side of the cheek. 1 spray as soon as possible after the pain has occurred. May be repeated once. If the pain does not decrease, supplement with morphine (3.4).
		Side-effects:	Blushing, headache, and nausea. May cause a minor fall in blood pressure.
		Validity:	2 years from the date of production (Glytrin®, Meda).
		Storage:	Not to be stored above 25°C. Protect from frost, direct heat and sunlight.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . Control the blood pressure, which should not be below 90 mm Hg systolic. Not to be used close to open fire or embers.

Hjertekrampe Smerter i hjertet Blodprop i hjertet Blodfortynding Se også 9.1	9.3	Lægemiddelstof:	Acetylsalicylsyre.
		Form:	Tabletter à 150 mg.
		Virkning:	Virker blodfortyndende. Forhindrer blodpropper.
		Dosering:	Akut: 300 mg som tygges Vedligehold: 75 mg dagligt
		Bivirkninger:	Øget blødningsrisiko. Risiko for allergiske reaktioner. Farlig dosis: 150 mg per kg legemsvægt.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Hjertemagnyl®, Nycomed Danmark).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Bør ikke gives til patienter med mavesår.
Cardiospasm Heart pain Coronary thrombosis Blood-thinning See also 9.1	9.3	Active pharmaceutical ingredients:	Acetylsalicylic acid.
		Form:	Tablets of 150 mg.
		Effect:	Thins the blood. Prevents thrombosis.
		Dosage:	Acute: 300 mg has to be chewed Hereafter: 75 mg, daily
		Side-effects:	Increased risk of bleeding. Risk of allergic reactions. Dangerous dosage: 150 mg per kg bodyweight
		Validity:	5 years from the date of production (Hjertemagnyl®, Nycomed Denmark).
		Storage:	Normal temperature.
<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . Not to be given to ulcer patients.		
Vand i lungerne Forhøjet blodtryk	9.4	Lægemiddelstof:	Furosemid.
		Form:	Tabletter à 40 mg.
		Virkning:	Tvinger væske ud af blodbanen via nyrerne til urinblæren, hvorefter væske suges fra lungerne (og andet væv). Virker 1/2 time efter indtagelse. Maksimumeffekt efter 2 timer. Virkningsvarighed: 3 - 6 timer.
		Dosering:	Vand i lungerne: 40 - 120 mg. Kan gentages efter 30 minutter. Blodtryksforhøjelse: 40 - 80 mg x 1 - 3 dagligt. (maksimalt 1500 mg/døgn).
		Bivirkninger:	Ingen relevante.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Furix®, Nycomed Danmark).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .

Lung edema High blood pressure	9.4	Active pharmaceutical ingredients:	Furosemide
		Form:	Tablets of 40 mg.
		Effect:	Extracts fluids from the blood vessel via the kidneys to the urinary bladder, after which the fluid is absorbed from the lungs (and other tissue). Takes effect after 1/2 hour. Maximum effect after 2 hours. Effective for 3-6 hours.
		Dosage:	Lungedema: 40-120 mg. May be repeated after 30 minutes High blood pressure: 40-80 mg once to three times daily (maximum 1500 mg/day).
		Side-effects:	None relevant.
		Validity:	5 years from the date of production (Furix®, Nycomed Denmark).
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> .
Vand i lungerne Forhøjet blodtryk	9.5	Lægemiddelstof:	Furosemid.
		Form:	Injektionsvæske 10 mg/ml. Ampuller à 4 ml til intramuskulær eller intravenøs injektion.
		Virkning:	Tvinger væske ud af blodbanen via nyrerne til urinblæren, hvorefter væske suges fra lungerne (og andet væv). Virker inden for 5 minutter efter IV. injektion. Maksimumeffekt inden 30 minutter.
		Dosering:	Individuelt. 40 - 120 mg. Kan gentages efter 30 minutter.
		Bivirkninger:	Ingen relevante.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Furix®, Nycomed Danmark).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Lung edema High blood pressure	9.5	Active pharmaceutical ingredients:	Furosemide.
		Form:	Injection liquid 10 mg/ml. Ampoules of 4 ml for intramuscular or intravenous injection.
		Effect:	Extracts fluids from the blood vessel via the kidneys to the urinary bladder, after which the fluid is absorbed from the lungs (and other tissue). Takes effect 5 minutes after I.V injection. Maximum effect within 30 minutes.
		Dosage:	Dependent on the patient. 40-120 mg. May be repeated after 30 minutes.
		Side-effects:	No relevant ones.
		Validity:	5 years from the date of production (Furix®, Nycomed Denmark).
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> .

Forhøjet blodtryk Hjertekrampe Smerter i hjertet Forebyggelse efter blodprop i hjertet	9.6	Lægemiddelstof:	Atenolol
		Form:	Tablet à 50 mg
		Virkning:	Sænker puls og blodtryk
		Dosering:	Forhøjet blodtryk: Voksne. 50-100 mg i døgnet. Hjertekrampe og hjerterytmeforstyrrelser: Sædvanligvis 50 mg 1 gang i døgnet stigende til 100 mg i døgnet. Forebyggelse efter blodprop i hjertet: 50-100 mg 1 gang i døgnet under kontrol af puls og blodtryk.
		Bivirkninger:	Træthed. Kvalme, opkastning, diarré, forstoppelse. Langsom puls, sammentrækning af blodkarrene, lavt blodtryk. Muskelsvaghed. Øget svedtendens.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato. (Atenolol, Orifarm Generics A/S)
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Bør ikke anvendes til patienter med astma, kroniske obstruktiv lungesygdom (KOL) og ved svær regulerbar sukkersyge.
High blood pressure Angina pectoris Heart pain Preventiv treatment after Coronary thrombosis	9.6	Active pharmaceutical ingredients:	Atenolol
		Form:	Tablets of 50 mg
		Effect:	Reduces pulse and blood pressure
		Dosage:	High blood pressure: Adults: 50- 100 mg daily Angina pectoris and heart rhythm disturbances: Usually 50 mg once a day, increasing to 100 mg daily. Prevention after coronary thrombosis: 50-100 mg once a day under the control of heart rate and blood pressure
		Side-effects:	Fatigue, nausea, vomiting, diarrhoea, constipation, low pulse, low blood pressure, contraction of blood vessels, muscle weakness, increased sweating.
		Validity:	5 years from the date of production (Atenolol, Orifarm Generics A/S)
		Storage:	Normal temperature
		<i>Remarks:</i>	Consult Radio Medical. Should not be used in patients with asthma, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and in severe controllable diabetes.

Grp. 10. Hudmidler / Dermatological agents

Svamp Hudsvamp (Se også 14.1)	10.2	Lægemiddelstof:	Miconazol.
		Form:	Creme 20 mg/g (2%).
		Virkning:	Dræber svampe i huden.
		Dosering:	Den angrebne hud indsmøres 2 gange dagligt. Behandlingen bør fortsætte 1 uge efter symptomfrihed.
		Bivirkninger:	Ingen relevante.
		Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato (Brentan®, McNeil Denmark ApS).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Bør ikke anvendes i åbne sår, i hårbund, skæg eller negle.
Fungus Skin fungus (See also 14.1)	10.2	Active pharmaceutical ingredients:	Miconazole.
		Form:	Lotion 20 mg/g (2%).
		Effect:	Restricts fungus growth in the skin.
		Dosage:	Apply to the skin twice daily The treatment should be continued for a week after the symptoms have disappeared.
		Side-effects:	No relevant ones.
		Validity:	2 years from the date of production (Brentan®, McNeil Denmark ApS).
		Storage:	Not above 25° C.
		<i>Remarks:</i>	Should not be used in open wounds, on scalps, beards, or nails.
Brandsår	10.4	Lægemiddelstof:	Sølvulfadiazin.
		Form:	Creme 10 mg/g (1%).
		Virkning:	Forebygger hudinfektioner ved brandsår.
		Dosering:	Påføres i et 3 - 5 mm tykt lag 1 gang per døgn.
		Bivirkninger:	Hudirritation.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Flamazine®, Smith & Nephew). Tuber bør kasseres 14 dage efter åbning.
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Se anvisningen i Søfartsstyrelsens Lægebog.
Burns	10.4	Active pharmaceutical ingredients:	Silver sulfadiazine.
		Form:	Lotion 10 mg/g (1%).
		Effect:	Prevents skin infections in connection with burns.
		Dosage:	Apply a thin layer of 3-5 mm to the skin once a day.
		Side-effects:	Skin irritation.
		Validity:	3 years from the date of production (Flamazine®, Smith & Nephew) Tubes should be discarded 14 days after opening.
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . See the instructions given in the Danish Maritime Authority's Medical Manual.

Grp. 10. Hudmidler / Dermatological agents

(continued)

Lus Fladlus Fnat	10.5	Lægemiddelstof:	Permethrin.
		Form:	Creme 50 mg/g (5%).
		Virkning:	Gift, der dræber lus, fnatmidler og deres æg.
		Dosering:	Påsmøres den rene og tørre hud. Cremen skal sidde i 8 - 12 timer før den afvaskes. Behandlingen gentages efter 8 dage.
		Bivirkninger:	Kløe og rødme af huden.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Nix®, ACO Hud Nordic AB).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Se instruktionen i indlægsseddel.
Lice Crab lice Scabies	10.5	Active pharmaceutical ingredients:	Permethrin.
		Form:	Lotion 50 mg/g (5%).
		Effect:	Poison that kills lice, scab mites, and their eggs.
		Dosage:	Apply to clean, dry skin. The cream should not be washed off until after 8-12 hours. The treatment is repeated after 8 days.
		Side-effects:	Itching and skin blushing.
		Validity:	5 years from the date of production (Nix®, ACO Hud Nordic AB).
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	See package leaflet.
Lus Fladlus Fnat	10.6	Lægemiddelstof:	Permethrin.
		Form:	Shampo 10 mg/g (1%).
		Virkning:	Gift, der dræber lus, fnatmidler og deres æg.
		Dosering:	Indgnides i det renvaskede, froterede og fugtige hår og hårbund. Shampooen skal sidde i 10 minutter før den skylles ud. Døde lus og æg fjernes med tætekam, mens håret endnu er vådt. Behandlingen gentages efter 8 dage.
		Bivirkninger:	Kløe og rødme af huden.
		Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato (Nix®, ACO Hud Nordic AB).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Se instruktionen i indlægsseddel.
Lice Crab lice Scabies	10.6	Active pharmaceutical ingredients:	Permethrin.
		Form:	Shampoo 10 mg/g (1%).
		Effect:	Poison that kills lice, scab mites, and their eggs.
		Dosage:	Apply to washed, rubbed, and wet hair and scalp. The shampoo should not be rinsed off until after 10 minutes. Dead lice and eggs are removed with a fine comb while the hair is still wet. The treatment is repeated after 8 days.
		Side-effects:	Itching and skin blushing.
		Validity:	2 years from the date of production (Nix®, ACO Hud Nordic AB).
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	See package leaflet.

Grp. 10. Hudmidler / Dermatological agents

(continued)

Eksem Psoriasis Hudkløe Solskoldning Hudsvie efter insektbid	10.7	Lægemiddelstof:	Glukokortikoid gruppe II
		Form:	Creme til udvortes brug
		Virkning:	Modvirker betændelsestilstande, der er fremkaldt af allergiske og toksiske årsager. Virker kløestillende og smertestillende.
		Dosering:	Voksne: Påsmøres tyndt 1-2 gange daglig.
		Bivirkninger:	Hudkløe brændende fornemmelse i huden, tynd hud, kontakteksem.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato. (Locoid, Astellas Pharma A/S)
		Opbevaring:	Almindelig temperatur. Må ikke opbevares koldt eller fryses.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> Må ikke anvendes i åbne sår.
Eczema Psoriasis Itching Sunburns Burning sensation after insect bites	10.7	Active pharmaceutical ingredients:	Glucocorticoid group II
		Form:	Lotion for external use
		Effect:	Eases inflammations caused by allergic or toxic agents. Antipruritic and analgesic.
		Dosage:	Adults: Apply a thin layer to the skin 1-2 times daily
		Side-effects:	Pruritic, burning sensation in the skin, thin skin, contact dermatitis
		Validity:	3 years from the date of production (Locoid, Astellas Pharma A/S)
		Storage:	Normal temperature. Do not refrigerate or freeze
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> .

Grp. 11. Desinficerende midler / Disinfectants

Rengøring af: 1.Instrumenter FØR og EFTER brug 2.Hænder 3. Intakt hud	11.1	Lægemiddelstof:	Klorhexidin/ethanol.
		Form:	Væske 0,5%/85%.
		Virkning:	Desinficerende.
		Dosering:	-
		<i>Anmærkninger:</i>	Må ikke anvendes i sår, i øjne eller på slimhinder. Indeholder 85 % alkohol. Se Søfartsstyrelsens Lægebog. Alternativt indkøbes Chlorhexidin 0,5 % og Ethanol minimum 70 %, i 2 separate flasker. Først anvendes Chlorhexidin, derefter Ethanol.
Disinfection of: 1.Instruments BEFORE and AFTER use 2.Hands 3. Intact skin	11.1	Active pharmaceutical ingredients:	Chlorhexidine/ethanol.
		Form:	Liquid 0.5%/85%.
		Effect:	Disinfective.
		Dosage:	-
		<i>Remarks:</i>	Not be used in wounds, in eyes, or on mucous membranes. Contains 85% alcohol. See the Danish Maritime Authority's Medical Manual. Alternatively, Chlorhexidine 0.5% and ethanol with a minimum of 70% may be purchased in 2 separate bottles. Use chlorhexidine first and then ethanol
Førstehjælpsbehandling af urene sår Mundskylning	11.2	Lægemiddelstof:	Klorhexidin.
		Form:	Væske 0,2%.
		Virkning:	Desinficerende.
		Dosering:	Kan anvendes i forurenede sår, der er utilgængelig for normal sårrensning.
		<i>Anmærkninger:</i>	Se Søfartsstyrelsens Lægebog.
First aid treatment of dirty wounds Mouth rinse	11.2	Active pharmaceutical ingredients:	Chlorhexidine.
		Form:	Liquid 0.2%.
		Effect:	Disinfective.
		Dosage:	May be used for dirty wounds that are not accessible for normal wound disinfection.
		<i>Remarks:</i>	See the Danish Maritime Authority's Medical Manual.

Grp. 12. Midler mod mave- og tarmsygdomme / Gastro intestinal agents

Forstoppelse	12.5	Lægemiddelstof:	Lactulose (disakkarid af galaktose og fruktose).
		Form:	Saft med 667 mg laktulose per ml.
		Virkning:	Den afførende virkning kan forventes efter 2 - 3 dages behandling. Binder væske i tarmen, hvorved afføringen blødgøres. Fremmer den normale tarmflora. Øger tarmenes bevægelser.
		Dosering:	15 - 30 ml dagligt.
		Bivirkninger:	Luftudvikling i tarmsystemet. Oppustethed.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Favolax, Orion Corporation).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Undersøg om tilstanden skyldes en sygdom med feber eller mangel på væske FØR anvendelsen. 30 - 50 ml dagligt kan øge insulinbehovet ved diabetikere.
Constipation	12.5	Active pharmaceutical ingredients:	Lactulose (disaccharide of galactose and fructose).
		Form:	Juice with 667 mg lactulose per ml.
		Effect:	The laxative effect may be expected after 2-3 days treatment. Binds liquids in the intestines so that faeces are softened. Further normal intestinal flora. Increases the motility of the intestines.
		Dosage:	15-30 ml daily
		Side-effects:	Intestinal gas. Bloating.
		Validity:	3 years from the date of production (Favolax Orion Corporation).
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . Examine whether the state has been caused by an illness accompanied by fever or a lack of liquids BEFORE use. 30-50 ml a day may increase the need for insulin in diabetic patients.
Diarré	12.6	Lægemiddelstof:	Loperamid.
		Form:	Tabletter à 2 mg.
		Virkning:	Hæmmer tarmenes bevægelser.
		Dosering:	Start: 2 tabletter. Pause 1 time. Derefter 1 tablet for hver uformet afføring. Maksimum: 8 tabletter (16 mg) per døgn.
		Bivirkninger:	Mundtørhed, kvalme, mavesmerter. Risiko for tarmstop.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Imodium®, McNeil).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Undersøg om den syge har feber. Bør kun anvendes til børn efter <i>Radio Medicals</i> anvisninger. Bør kun anvendes kortvarigt ved akut diarré hos i øvrigt upåvirkede personer.

Grp. 12. Midler mod mave- og tarmsygdomme / Gastro intestinal agents

(continued)

Diarrhoea	12.6	Active pharmaceutical ingredients:	Loperamide.
		Form:	Tablets of 2 mg.
		Effect:	Restricts the motility of the intestines.
		Dosage:	Start: 2 tablets. Wait for 1 hour. 1 tablet for every loose stool. Maximum: 8 tablets (16 mg) daily
		Side-effects:	Dry mouth, nausea, slight stomach pains. Risk of intestinal stop.
		Validity:	5 years from the date of production (Imodium®, McNeil).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Examine whether the patient has a fever. Should only be given to children on directions given by Radio Medical. Use only for a short period of time in case of acute diarrhoea on patients not otherwise affected.
Væsketab Salttab Febertilstande Opkastninger Diarré	12.7	Lægemiddelstof:	Glucose/kaliumklorid/magnesiumsulfat/natriumcitrat/natriumklorid.
		Form:	Afdelte pulvere.
		Virkning:	Erstatter væske og salte.
		Dosering:	1 pulver opløses i 1 liter kogt, afkølet vand. Basisbehov: 2,5 liter per døgn. For hver grad over 37° C gives yderligere 300 ml per døgn. For hver diarré gives yderligere 200 ml per døgn.
		Bivirkninger:	Ingen.
		Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato (Revolyt®, Gunnar Kjems APS).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur. Færdigblandet opløsning opbevares i køleskab
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Loss of fluid Loss of salt Feverish conditions Vomiting Diarrhoea	12.7	Active pharmaceutical ingredients:	Glucose/potassium/magnesium/sodium citrate/sodium.
		Form:	Divided powder.
		Effect:	Replaces liquids and salts.
		Dosage:	1 powder is dissolved in 1 litre of boiled, cooled water. Basic need: 2.5 litres daily. For every degree above 37° C, the patient is given another 300 ml daily. For every instance of diarrhoea, the patient is given another 200 ml daily
		Side-effects:	None.
		Validity:	2 years from the date of production (Revolyt®, Gunnar Kjems APS).
		Storage:	Normal temperature. The mixed dissolution should be stored in a cold place.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> .

Grp. 12. Midler mod mave- og tarmsygdomme / Gastro intestinal agents

(continued)

Mavesår	12.8	Lægemiddelstof:	Omeprazol
		Form:	Tablet eller kapsel 20 à mg
		Virkning:	Hæmmer dannelsen af mavesyre
		Dosering:	Mavesår: 20 – 40 mg dagligt. Langtidsbehandling: 10 – 20 mg dagligt
		Bivirkninger:	Kvalme, opkastning, diarré, forstoppelse, luft i tarmen. Hovedpine, træthed, svimmelhed, søvnforstyrrelser.
		Holdbarhed:	4 år fra produktionsdato. (Omeprazol, Copyfarm A/S)
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Kan eventuelt kombineres med antibiotika
Stomach ulcer	12.8	Active pharmaceutical ingredients:	Omeprazol
		Form:	Tablet or capsules of 20 mg
		Effect:	Inhibits gastric acid secretion
		Dosage:	Stomach ulcer: 20-40 mg daily. Long term treatment: 10-20 mg daily.
		Side-effects:	Nausea, vomiting, diarrhoea, constipation, flatulence, headache, fatigue, dizziness, sleep disturbances.
		Validity:	4 years from the date of production (Omeprazol, Copyfarm A/S)
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . Can be combined with antibiotics.
Sure opstød Halsbrand	12.9	Lægemiddelstof:	Antacida
		Form:	Tablet eller oral opløsning
		Virkning:	Neutraliserer mavesyre
		Dosering:	Jf. indlægsseddel i præparatet Efter ordination af Radio Medical
		Bivirkninger:	Forstoppelse, diarré
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Alminox®, Nycomed Danmark)
		Opbevaring:	Almindelig temperatur
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Acid indigestion Heartburn	12.9	Active pharmaceutical ingredients:	Antacid
		Form:	Tablet or oral solution
		Effect:	Neutralizes acid in the stomach
		Dosage:	See patients information leaflet. Prescription from Radio Medical
		Side-effects:	Constipation, diarrhoea
		Validity:	5 years from the date of production (Alminox®, Nycomed Danmark)
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> .

Grp. 12. Midler mod mave- og tarmsygdomme / Gastro intestinal agents

(continued)

Hæmorider Kløe ved endetarmen Smerter ved afføring	12.10	Lægemiddelstof:	Antihæmoride creme (skal indeholde glucokortikoid og smertestillende middel)
		Form:	Salve eller creme.
		Virkning:	Lindring af smerter, hævelse, brændende fornemmelse og kløe i forbindelse med hæmoroider og analrifter.
		Dosering:	Voksne: Smøres på 2-3 gange daglig, samt efter afføring.
		Bivirkninger:	Anal slimhindeatrofi
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato. (Proctosedyl, 2care4 ApS)
		Opbevaring:	Almindelig temperatur
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Haemorrhoids Itching at the rectum Pain during defecation	12.10	Active pharmaceutical ingredients:	Anti haemorrhoid ointment (Must contain glucocorticoid and analgesic)
		Form:	Ointment
		Effect:	Relief of pain, swelling and burning sensation / itching associated with haemorrhoids, anal lacerations.
		Dosage:	Apply 2-3 times daily and after defecation
		Side-effects:	Thin skin in the anus.
		Validity:	3 years from the date of production (Proctosedyl, 2care4 ApS)
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> .
Kvalme Opkastninger	12.12	Lægemiddelstof:	Domperidon
		Form:	Tabletter à 10 mg.
		Virkning:	Øger mave og tarmenes bevægelser, hvilket medfører en hurtigere tømning. Påvirker brækcenteret, hvilket medfører at kvalme og opkastninger aftager.
		Dosering:	10 mg max 3 gange dagligt.
		Bivirkninger:	Mundtørhed, dødsighed, tristhed, uro og rastløshed.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Motilium®, Janssen -Cilag).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Bør ikke anvendes til børn < 35 kg Bør kun anvendes kortvarigt (op til 1 uge).
Nausea Vomiting	12.12	Active pharmaceutical ingredients:	Domperidon
		Form:	Tablets of 10 mg.
		Effect:	Increases the motility of the stomach and the intestines causing a faster emptying. Affects the vomiting centre so that the nausea and vomiting decrease.
		Dosage:	10 mg maximum three times daily
		Side-effects:	Dry mouth, drowsiness, sadness, and restlessness.
		Validity:	5 years from the date of production (Motilium® Janssen-Cilag).
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . Not to be given to children <35 kg. Only for short use (1 week)

Grp. 13. Øjen- og øremidler / Agents for Eyes and Ears

Svejsøjne Lokalbedøvelse af øjet	13.2	Lægemiddelstof:	Cinchocain.
		Form:	Salve à 5 mg/g.
		Virkning:	Lokalbedøvende.
		Dosering:	1 cm salve bag nederste øjenlåg. Kan gentages efter et par minutter.
		Bivirkninger:	Risiko for maskering af skader eller sygdomme i øjet. Forsinket sårheling.
		Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato (Cincain "Optha", Ophta).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Kan ikke anvendes sammen med kontaktlinser.
Arc eye / Welders eye Local anaesthetic of the eye	13.2	Active pharmaceutical ingredients:	Cinchocaine.
		Form:	Ointment of 5 mg/g.
		Effect:	Local anaesthetic.
		Dosage:	Apply 1 cm of ointment behind the lower eyelid. May be repeated after a couple of minutes.
		Side-effects:	Risk of masking injuries or diseases in the eye. Delayed healing of wounds.
		Validity:	2 years from the date of production (Cinchaine, "Optha", Ophta).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . Not to be used when wearing contact lenses.
Allergiske øjensygdomme Inflammatoriske øjensygdomme (se også 13.7) Øregangseksem	13.3	Lægemiddelstof:	Dexamethason.
		Form:	Dråber à 1 mg/ml.
		Virkning:	Standser den allergiske eller inflammatoriske proces.
		Dosering:	Øjet: 1 - 2 dråber bag nederste øjenlåg hver time indtil bedring. Herefter 1 dråbe 4 - 6 gange per døgn. Øret: Øregangen renses, tørres og pakkes med gaze, der er gennemvædet med dexamethason. Gazen holdes fugtig med opløsningen og fjernes efter 24 timer. Behandlingen gentages så længe <i>Radio Medical</i> skønner det nødvendigt.
		Bivirkninger:	Allergi. Risiko for maskering af infektioner, skader eller sygdomme i øjet.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Maxidex®, S.A. Alcon-couvreur N.V.).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Kan ikke anvendes sammen med kontaktlinser.

Grp. 13. Øjen- og øremidler / Agents for Eyes and Ears

(continued)

Allergic eye diseases Inflammatory eye diseases (see also 13.7) Ear eczema	13.3	Active pharmaceutical ingredients:	Dexamethasone.
		Form:	Eye drops of 1 mg/ml.
		Effect:	Stops the allergic or inflammatory process.
		Dosage:	The eye: 1-2 drops behind the lower eyelid every hour until improvement. Subsequently, 1 drop four-six times daily. The ear: The auditory canal is cleansed and dried, and gauze soaked in dexamethasone is applied. The gauze is kept humid with the dissolution and removed after 24 hours. The treatment is repeated for as long as found necessary by <i>Radio Medical</i> .
		Side-effects:	Allergy. Risk of masking of infections, injuries, or diseases in the eye.
		Validity:	3 years from the date of production produktionsdato (Maxidex®, S.A. Alcon-couvreur N.V.).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . Not to be used when wearing contact lenses.
Grøn stær: Smerter i øjet Regnbuesyn Tågesyn	13.4	Lægemiddelstof:	Pilocarpin.
		Form:	Dråber à 20 mg/ml.
		Virkning:	Nedsætter trykket i det indre øje.
		Dosering:	Hyppig drypning bag nederste øjenlåg efter ordination fra <i>Radio Medical</i> .
		Bivirkninger:	Sammentrækning i pupillens lukkemuskel ("knappenålpupil") og hovedpine.
		Holdbarhed:	1½ år fra produktionsdato (Pilocarpin "ophta"®, Ophtha A/S) Må højst anvendes 1 måned efter åbning.
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Kan ikke anvendes sammen med kontaktlinser.		
Glaucoma: Pains in the eye, Rainbow vision, Blurred vision	13.4	Active pharmaceutical ingredients:	Pilocarpine.
		Form:	Eye drops of 20 mg/ml.
		Effect:	Reduces pressure inside the eye.
		Dosage:	Frequent drops behind the lower eyelid after prescription from <i>Radio Medical</i> .
		Side-effects:	Spasms of the sphincter of the pupil ("pin-hole pupil") and headache.
		Validity:	1½ years from the date of production (Pilocarpin "ophtha"®, Ophtha A/S). To be use within 1 month, from opening the package.
		Storage:	Normal temperature.
Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . Not to be used when wearing contact lenses.		

Grp. 13. Øjen- og øremidler / Agents for Eyes and Ears

(continued)

Herpes Helvedesild	13.6	Lægemiddelstof:	Aciclovir.
		Form:	Øjensalve à 30 mg/g.
		Virkning:	Hæmmer virus.
		Dosering:	Øjet: 1 cm salve bag nederste øjenlåg 5 gange dagligt indtil 3 døgn efter symptomfrihed. Kan tillige anvendes ved herpesangreb på læberne.
		Bivirkninger:	Øjenirritation.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Zovir®, GlaxoSmithKline Pharma A/ S).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Kan ikke anvendes sammen med kontaktlinser.
Herpes Shingles	13.6	Active pharmaceutical ingredients:	Acyclovir.
		Form:	Eye ointment of 30 mg/g.
		Effect:	Restricts virus.
		Dosage:	The eye: Apply ointment in a layer of 1 cm behind the lower eyelid five times a day until 3 days after the patient is free of symptoms. May also be used in case of herpes infections of the lips.
		Side-effects:	Irritation of the eye.
		Validity:	5 years from the date of production (Zovir®, GlaxoSmithKline Pharma A/S).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . Not to be used when wearing contact lenses.
Øjenbetændelse Betændelse i øjenlåg og øjets omgivelser. Forebyggelse af betændelse efter øjenundersøgelse og fjernelse af fremmedlegemer.	13.8	Lægemiddelstof:	Fusidin
		Form:	Øjendråber / øjen gel 1%
		Virkning:	Bakteriedræbende
		Dosering:	1 dråbe x 2 dagligt
		Bivirkninger:	Øjenirritation, øjenkløe og rødme
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato, (Fucithalamic, 2care4 ApS)
		Opbevaring:	Almindelig temperatur
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Kan ikke anvendes sammen med kontaktlinser.
Inflammation of the eyes. Inflammation of the eyelid, and the surroundings of the eye. Prevention of inflammation of the eyes after removal of foreign bodies.	13.8	Active Pharmaceutical ingredients:	Fusidin
		Form:	Eye drops / Eye gel 1 %
		Effect:	Kills bacteria
		Dosage:	1 drop twice daily
		Side-effects:	Irritation of the eye, eye itching and blushing.
		Validity:	3 years from the date of production (Fucithalamic, 2care4 ApS)
		Storage:	Normal temperature
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . Not to be used in connection with contact lenses

Grp. 13. Øjen- og øremidler / Agents for Eyes and Ears

(continued)

Blødgøring og løsning af ørevoks.	13.9	Lægemiddelstof:	Allantoin
		Form:	Væske
		Virkning:	Blødgør og løsner ørevoks
		Dosering:	10-20 dråber dryppes i øret. Et stykke vat anbringes i øret og personen lejres således at dråberne forbliver i øret. Efter 20 -50 min. skylles øret med lunkent vand (37°C).
		Bivirkninger:	Se indlæggelseseddell
		Holdbarhed:	Se produktet.(Removax®)
		Opbevaring:	Opbevares ved almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> Må ikke anvendes hvis der er hul i trommehinden. Må ikke anvendes ved betændelse eller smerter i øret og ved allergi overfor indholdsstofferne.
Softens and loosens cerumen	13.9	Active Pharmaceutical ingredients:	Allantoin
		Form:	Fluid
		Effect:	Softens and dissolving earwax
		Dosage:	10-20 drops in the ear. A piece of cotton wool is placed in the ear and the person is placed, so that the droplets remain in the ear. After 20-50 min rinse the ear with warm water (37° C).
		Side-effects:	See package leaflet.
		Validity:	See expire date on the product (Remowax ®)
		Storage:	Normal temperature
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . Do not use if there is a hole in the eardrum. Not for use by inflammation or pain in the ear and allergy to the ingredients.
Inflammatoriske øjensygdomme	13.11	Lægemiddelstof:	Tropicamid
		Form:	Øjendråber 1%
		Virkning:	Udvider pupillen
		Dosering:	Akut: 1-2 dråber 3 gange dagligt.
		Bivirkninger:	Feber, forstoppelse, hjertebanken, hallucinationer, excitation, konfusion, ansigtsrødme, akkomodationsbesvær, øjenirritation, fotofobi.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato,(Mydriacyl® , S.A. Alcon-couvreur N.V)
		Opbevaring:	Almindelig temperatur
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Inflammatory eye diseases	13.11	Active Pharmaceutical ingredients:	Tropicamid
		Form:	Eye drops 1%
		Effect:	Enlarges the pupil
		Dosage:	Acut: 1-2 drops 3 times a day.
		Side-effects:	Fever, constipation, palpitations, hallucinations, excitation, comfusion, flushing, difficulties with accommodation, eye irritation, photophobia
		Validity:	3 years from the date of production,(Mydriacyl® , S.A. Alcon-couvreur N.V)
		Storage:	Normal temperature
		<i>Remarks:</i>	Consult Radio Medical.

Grp. 13. Øjen- og øremidler / Agents for Eyes and Ears

Øregangs eksem	13.12	Lægemiddelstof:	Ciprofloxacin / Hydrocortison
		Form:	Øredråber
		Virkning:	Behandling af øregangs eksem
		Dosering:	3 dråber i berørte øre 2 gange daglig
		Bivirkninger:	Ørekløe, øresmerter, svimmelhed
		Holdbarhed:	Ubrudt 2 år fra produktionsdato (Ciflox, Novartis Healthcare A/S)
		Opbevaring:	Beskytte mod lys og ikke over 25 c. Må ikke opbevares i køleskab.
		Anmærkninger:	Søg samråd med Radio Medical Danmark
Ear eczema	13.12	Active Pharmaceutical ingredients:	Ciprofloxacin / Hydrocortisone
		Form:	Eardrops
		Effect:	Treatment of ear canal eczema
		Dosage:	3 drops in affected ear twice daily
		Side-effects:	Ear itching, earache, dizziness
		Validity:	Unbroken 2 years from production date (Ciflox, Novartis Healthcare A/S)
		Storage:	Protect from light and not more than 25 c. Do not refrigerate.
		Remarks:	Consult Radio Medical Danmark

Grp. 14. Gynækologiske midler / Gynaecological agents

Svamp i skeden Hudsvamp (se også 10.1 og 10.2) Neglesvamp	14.1	Lægemiddelstof:	Fluconazol.
		Form:	Kapsler à 150 mg.
		Virkning:	Hæmmer svampevækst.
		Dosering:	Skedesvamp: 150 mg som éngangsdosis. Hudsvamp: 150 mg per uge i 4 - 6 uger. Neglesvamp: 150 mg per uge i 3 - 12 måneder (til en ny negl er dannet).
		Bivirkninger:	Allergi. I sjældne tilfælde alvorlig leverforgiftning. Fluconazol påvirker virkningen af adskillige andre medikamenter, herunder bl.a. blodfortyndende og beroligende midler samt p-piller.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Fluconazol "KRKA", KRKA Sverige AB).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Bør ikke anvendes til gravide.
Vaginal fungus Skin fungus (see also 10.1 and 10.2) Nail fungus	14.1	Active Pharmaceutical ingredients:	Fluconazole.
		Form:	Capsule of 150 mg.
		Effect:	Restricts fungal growth.
		Dosage:	Vaginal fungus: 150 mg as a single dose. Skin fungus: 150 mg a week for 4-6 weeks. Nail fungus: 150 mg a week for 3-12 months (until a new nail has been formed).
		Side-effects:	Allergy In rare cases, serious liver poisoning. Fluconazole affects the effect of several other medicaments, including inter alia blood-thinning substances, sedatives, and birth control pills.
		Validity:	5 years from the date of production (Fluconazol "KRKA", KRKA Sverige AB).
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . Not to be used by pregnant women.
Blødning EFTER abort eller fødsel	14.2	Lægemiddelstof:	Methylergometrin.
		Form:	Tabletter à 0,125 mg.
		Virkning:	Livmoderssammentrækkende.
		Dosering:	Efter abort eller fødsel: 0,125 - 0,250 mg 3 gange dagligt.
		Bivirkninger:	Overfølsomhed, hovedpine, mavesmerter, forhøjet blodtryk, hududslet.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Methergin®, Novartis).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Må ikke anvendes til gravide med blødninger.

Grp. 14. Gynækologiske midler / Gynaecological agents

(continued)

Bleeding AFTER giving birth or miscarriage	14.2	Active Pharmaceutical ingredients:	Methylergometrine.
		Form:	Tablets of 0.125 mg.
		Effect:	Contracts the uterus.
		Dosage:	After giving birth or miscarriage: 0.125-0.250 mg three times daily
		Side-effects:	Allergy, headache, stomach ache, high blood pressure, rash.
		Validity:	5 years from the date of production (Methergine®, Novartis).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . Not to be used by pregnant women who are bleeding.

Grp. 15. Midler mod forkølelse og astma / Agents for common Cold and Asthma

Hostestillende	15.1	Lægemiddelstof:	Dextromethorphan.
		Form:	Tabletter á 30 mg
		Virkning:	Hostestillende.
		Dosering:	15-30 mg. 3-4 gange daglig
		Bivirkninger:	Ufrivillige muskelsammentrækning, dødsighed, svimmelhed, hallucinationer, mani.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Dexofan® Nycomed)
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Bør ikke anvendes af børn under 6 år Bør ikke anvendes ved samtidig behandling med 7.6 og 7.7 Metronidazol. Bør ikke anvendes ved samtidig behandling med Disulfiram (Antabus®)
Cough	15.1	Active Pharmaceutical ingredients:	Dextromethorphan.
		Form:	Tablets of 30 mg
		Effect:	Reduces coughs.
		Dosage:	15 – 30 mg. 3-4 times daily
		Side-effects:	Unvoluntary muscle contraction, drowsiness, dizziness, hallucinations and mania.
		Validity:	3 years from the date of production (Dexofan®, Nycomed).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . Should not be used by children under the age of 6 years Should not be used during concomitant treatment with 7.6 or 7.7 Metronidazole. Should not be used during concomitant treatment with disulfiram (Antabuse®)

Grp. 15. Midler mod forkølelse og astma / Agents for common Cold and Asthma

(continued)

Førstevalg ved astma og astmalignende vejrtrækning som følge af udsættelse for røg, gasarter og dampe. Truende for tidlig fødsel.	15.2	Lægemiddelstof:	Terbutalin.
		Form:	Pulver i turbuhaler. 0,5 mg per dosis.
		Virkning:	Løser kramper i den glatte muskulatur i luftvejene. Afslapper livmoderens muskulatur.
		Dosering:	1 dosis efter behov. Højest 6 gange dagligt.
		Bivirkninger:	Muskelrystelser og hurtig puls. Nældefeber. Rødt hududslæt.
		Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato (Bricanyl® Turbuhaler, AstraZeneca).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur. Opbevares tørt.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Hvis virkningen udebliver forsøges med 15.3. Hvis vejrtrækningen bedres fortsæt med 15.4 eller 4.3.
First choice of medicament in case of asthma and asthma-like breathing caused by exposure to smoke, gases and fumes. Imminent premature birth	15.2	Active Pharmaceutical ingredients:	Terbutaline.
		Form:	Powder, turbuhaler. 0.5 mg per dosage.
		Effect:	Loosens convulsions in the smooth musculature in the respiratory tract. Relaxes the musculature of the uterus.
		Dosage:	1 dose as required. Maximum six times daily
		Side-effects:	Muscle contractions and rapid pulse. Urticaria. Red rash.
		Validity:	2 years from the date of production (Bricanyl®, Turbuhaler, AstraZeneca).
		Storage:	Normal temperature. To be stored in a dry place.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . If there is no effect, try remedy 15.3. If respiration is improved, continue with remedy 15.4 or 4.3.
Astma og astmalignende vejrtrækning som følge af udsættelse for røg, gasarter og dampe.	15.4	Lægemiddelstof:	Budesonid.
		Form:	Pulver i turbuhaler. 200 µg per dosis.
		Virkning:	Fjerner inflammatorisk hævelse i luftvejene.
		Dosering:	1 dosis efter behov. Højest 8 gange per døgn.
		Bivirkninger:	Overfølsomhedsreaktioner.
		Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato (Spirocort® Turbuhaler, AstraZeneca).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Budesonid anvendes efter effekt er opnået med terbutalin
Asthma or asthma-like breathing caused by exposure to smoke, gases, and fumes.	15.4	Active Pharmaceutical ingredients:	Budesonide.
		Form:	Powder. Turbuhaler. 200 µg per dose.
		Effect:	Removes inflammatory swelling of the respiratory tract.
		Dosage:	1 dose as required. Maximum eight times daily.
		Side-effects:	Allergic reactions.
		Validity:	2 years from the date of production (Spirocort®, Turbuhaler, AstraZeneca).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . Budesonide is used when an effect has been achieved by

Grp. 15. Midler mod forkølelse og astma / Agents for common Cold and Asthma

(continued)

Forkølelse Bihulebetændelse Kæbehulebetændelse Pandehulebetændelse Mellemørebetændelse	15.5	Lægemiddelstof:	Xylometazolin.
		Form:	Næsedråber/næsespray. 1 mg/ml.
		Virkning:	Skaffer afløb fra mellemøret, bihuler, pandehuler og kæbehuler. Virker øjeblikkeligt og i 10 - 12 timer.
		Dosering:	2 pust/dråber i hvert næsebor 2 - 3 gange dagligt i
		Bivirkninger:	Ved længere tids anvendelse kan stoffet skade næsens
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Zymelin®, Nycomed Danmark).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Må ikke anvendes ved symptomer på grøn stær (se 13.4).
Cold Sinusitis Maxillary sinusitis Frontal sinusitis Otitis media	15.5	Active Pharmaceutical ingredients:	Xylometazoline.
		Form:	Nose drops/nose spray. 1 mg/ml.
		Effect:	Opens drainage from middle ears and sinuses. Takes effect immediately and stays effective for 10-12 hours.
		Dosage:	2 sprays/drops in each nostril two-three times daily for a
		Side-effects:	If used for a long period, the substance may damage the
		Validity:	3 years from the date of production (Zymelin®, Nycomed Danmark).
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Not to be used if there are symptoms of glaucoma (see 13.4).
Asthma eller astmalignende vejrtrækning som følge af udsættelse for røg, gas- arter og dampe. Truende for tidlig fødsel	15.6	Lægemiddelstof:	Sabutamol
		Form:	Injektionsvæske 0,5 mg/ml, ampuller à 1 ml til subcutan eller intramuskulær injektion.
		Virkning:	Løser kramper i den glatte muskulatur i luftvejene. Afslapper livmoderens muskulatur.
		Dosering:	Akut: 0,5 mg indgives subcutant eller intramuskulært. Kan gentages.
		Bivirkninger:	Muskelrystelser og hurtig puls. Hovedpine og svimmelhed
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Ventoline, GlaxoSmithKline Pharma A/S.).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur. Beskyttet mod lys.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med Radio Medical. Behandlingen kan fortsættes med 4.3.
Asthma or asthma-like breathing caused by exposure to smoke, gases, and fumes. Imminent premature birth	15.6	Active Pharmaceutical ingredients:	Salbutamol
		Form:	Injection liquid 0.5 mg/ml, ampoules of 1 ml for subcutaneous or intramuscular injection.
		Effect:	Loosens convulsions in the smooth musculature in the respiratory tract. Relaxes the musculature of the uterus.
		Dosage:	Acute: 0.5 mg given subcutaneously or intramuscularly. May be repeated.
		Side-effects:	Muscle contractions and rapid pulse. Headache and dizziness
		Validity:	3 years from the date of production (Ventoline, GlaxoSmithKline Pharma A/S).
		Storage:	Normal temperature. To be protected from light.
		<i>Remarks:</i>	Consult Radio Medical. The treatment can be continued with 4.3

Grp. 16 Infusionsvæsker og lign. / Liquid for infusion and similar			
1. valgs præparat ved: Blodtab Væsketab Forebyggelse af shock	16.1	Lægemiddelstof:	Natriumklorid.
		Form:	Infusionsvæske 9 mg/ml. Beholdere à 1000 ml til intravenøs anvendelse.
		Virkning:	Erstatter væske og salte.
		Dosering:	Normalt ikke over 500 ml per time (godt 150 dråber per minut). 20 dråber = 1 ml.
		Bivirkninger:	Ingen relevante.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Natriumklorid isotonisk, Frenius Kabi).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Ved malaria og ved hjertetilfælde bør infusionshastigheden være langsom af hensyn til risikoen for udvikling af lungeødem (9.4/9.5).
First choice of medicament in case of: Loss of blood Loss of liquid Prevention of shock	16.1	Active Pharmaceutical ingredients:	Sodium chloride
		Form:	Infusion liquid 9 mg/ml. Containers of 1000 ml for intravenous use.
		Effect:	Replaces liquids and salts.
		Dosage:	Normally, no more than 500 ml per hour (about 150 drops a minute). 20 drops = 1 ml.
		Side-effects:	None relevant.
		Validity:	3 years from the date of production (Sodium chloride, Frenius Kabi).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . In case of malaria and heart attacks, the infusion speed should be slow because of the risk of developing lung oedema (9.4/9.5).
Ernæringserstatning Væsketab (Se også 12.7)	16.2	Lægemiddelstof:	Glucose og natriumklorid.
		Form:	Infusionsvæske med glucose 25 mg/ml og natriumklorid 4,5 mg/ml. Beholdere à 1000 ml til intravenøs anvendelse.
		Virkning:	Erstatter væske, glucose og salte.
		Dosering:	Normalt ikke over 500 ml per time (godt 150 dråber per minut). 20 dråber = 1 ml.
		Bivirkninger:	Ingen relevante.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Natriumklorid-Glucose "Braun", B. Braun Medical A/S).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Ved malaria og ved hjertetilfælde bør infusionshastigheden være langsom af hensyn til risikoen for udvikling af lungeødem (9.4/9.5).

Grp. 16 Infusionsvæsker og lign. / Liquid for infusion and similar

(continued)

Food substitute Loss of liquids (See also 12.7)	16.2	Active Pharmaceutical ingredients:	Glucose and sodium chloride.
		Form:	Infusion liquid containing glucose 25 mg/ml and sodium chloride 4.5 mg/ml. Containers of 1000 ml for intravenous use.
		Effect:	Replaces liquids, glucose and salts.
		Dosage:	Normally, no more than 500 ml per hour (about 150 drops a minute). 20 drops = 1 ml.
		Side-effects:	None relevant.
		Validity:	3 years from the date of production (Natriumklorid-Glucose"Braun", B. Braun Medical A/S).
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . In case of malaria and heart attacks, the infusion speed should be slow because of the risk of developing lung oedema (9.4/9.5).
Væske til gennemsylning af intravenøs kanyle. Sårbehandling. Øjenbehandling	16.5	Lægemiddelstof:	Natriumklorid
		Form:	Væske 0,9% i ca. 20 ml beholder
		Virkning:	Fjerner blod fra venekanyle, renses sår og øjne
		Dosering:	Se instruks i Søfartsstyrelsens lægebog eller efter ordination fra Radio Medical
		Bivirkninger:	Ingen relevante
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Fresenius Kabi)
		Opbevaring:	Almindelig temperatur
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Fluid for flushing intravenous needle. Treatment of wounds. Treatment of eyes	16.5	Active pharmaceutical ingredients:	Sodium chloride
		Form:	Fluid 0,9 % in containers of 20 ml
		Effect:	Removes blood from intravenous needle, clean wounds and eyes
		Dosage:	See the instructions in The Maritime Medical Manual or on prescription from Radio Medical.
		Side-effects:	No relevant ones
		Validity:	3 years from the date of production (Fresenius Kabi)
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> .

Grp. 16 Infusionsvæsker og lign. / Liquid for infusion and similar

(continued)

2. valgs præparat ved: Blodtab Shock eller risiko for shock, når årsagen er et akut blodtab MFAG, appendix 13	16.6	Lægemiddelstof:	Gelatine, Natriumchlorid
		Form:	Infusionsvæske 40 g succinyleret gelatine og 7 g natriumchlorid / liter. Beholdere à 500 ml til intravenøs anvendelse.
		Virkning:	Udvider plasmavolumenet svarende til den indgivne mængde.
		Dosering:	Efter ordination fra Radio Medical. På grund af risikoen for overfølsomhedsskock indgives de første 10 - 20 ml under stor forsigtighed og nøje observation. Ved overfyldning af kredsløbet indgives Furosemid (9.5).
		Bivirkninger:	Allergiske reaktioner. Overfølsomhedsskock.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (.Gelefusine, Plast flaske , B. Braun Melsungen AG)
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med Radio Medical.
Second choice of medicament in case of: Loss of blood Shock or risk of shock caused by an acute loss of blood MFAG, appendix 13	16.6	Active Pharmaceutical ingredients:	Gelatine, Sodium chloride
		Form:	Infusion liquid.40 g succinyleret gelatine og 7 g Sodium Chloride / litre Containers of 500 ml for intravenous use.
		Effect:	Enlarges the plasma volume equivalent to the amount infused.
		Dosage:	After ordination from Radio Medical. Because of the risk of allergic shock, the first 10-20 ml are infused very carefully and under close observation. If overloading including oedema of the lungs occurs: Give Furosemide (9.5).
		Side-effects:	Allergic reactions. Allergic shock.
		Validity:	3 years from the date of production (Gelofusine, Plastic bottle B. Braun Melsungen AG).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult Radio Medical.

***Fortegnelse og kontroldokument over
lægemiddelstoffer***

***Inventory and Control Document
of Active Pharmaceutical Ingredients***

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/Form	Styrke / Strength	Mængde/ Quantity A
Grp. 1 Ilt / Oxygen					
1.1	V03AN01	Medicinsk ilt	Gas	-	20 l/ 200 bar
1.1	V03AN01	Oxygen, Medical	Gas		20 l/ 200 bar
1.3	V03AN01	Medicinsk ilt passende til A.1 (se note)	Gas	-	2 x 2 l/ 200 bar
1.3	V03AN01	Oxygen Medical suitable to A.1 (see note)	Gas	-	2 x 2 l/ 200 bar
1.3 Meddelelser A kapitel A IX B, bilag 1 / Notice A Chapter IX B, annex 1					
Grp. 2 Lokalbedøvelse / Local Anaesthetic					
2.1 (π)	N01BB02	Lidocain	Inj. Væske	10 mg/ ml	5 x 20 ml
2.1 (π)	N01BB02	Lidocaine	Inj. Liquid	10 mg/ ml	5 x 20 ml
2.2	D04AB01	Lidocain	Gel	2%	2 x 30 g
2.2	D04AB01	Lidocaine	Gel	2%	2 x 30 g
Grp. 3 Smertestillende midler / Analgesics					
3.1	N02BE01	Paracetamol	Tablet	500 mg	200 stk.
3.1	N02BE01	Paracetamol	Tablets	500 mg	200 pcs.
3.2 (π)	M01AE01	Ibuprofen	Tablet	400 mg	100 stk.
3.2 (π)	M01AE01	Ibuprofen	Tablets	400 mg	100 pcs.
3.4 (π)	N02AA01	Morfin Δ	Inj. Væske	10 mg / ml	10 x 1 ml
3.4 (π)	N02AA01	Morphine Δ	Inj. Liquid	10 mg / ml	10 x 1 ml
3.5 (π)	N02AX02	Tramadol Δ	Tablet / Kapsel	50 mg	50 stk.
3.5 (π)	N02AX02	Tramadol Δ	Tablet / Capsula	50 mg	50 pcs.
3.7	M02AA15	Diclofenac	Gel	11,6 mg / g	50 g
3.7	M02AA15	Diclofenac	Gel	11,6 mg / g	50 g
3.8 (π)	M01AB05	Diclofenac	Supp.	50 mg	50 stk.
3.8 (π)	M01AB05	Diclofenac	Supp.	50 mg	50 pcs.
Grp. 4 Allergi, shock og søsyge / Allergy, Shock and Seasickness					
4.1 (π)	C01CA24	Adrenalin "K"	Inj. Væske	1 mg / ml	5 x 1ml
4.1(π)	C01CA24	Epinephrine "R"	Inj. Liquid	1 mg / ml	5 x 1ml
4.2	R06AX18	Acrivastin	Kapsel	8 mg	12 pcs.
4.2	R06AX18	Acrivastine	Capsula	8 mg	12 pcs.
4.3 (π)	H02AB09	Hydrocortison	Inj. Tørstof + væske	100 mg	2 hætteglas
4.3(π)	H02AB09	Hydrocortisonsuccinate	Inj. Subst + solvens	100 mg	2 vials
4.5	N07CA02	Cinnarizin Δ	Tablet	25 mg	50 pcs.
4.5	N07CA02	Cinnarizine Δ	Tablets	25 mg	50 pcs.

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Styrke / Strength	Mængde/ Quantity A
Grp. 5 Antidoter / Antidotes					
5.1 (π)	V03AB15	Naloxon	Inj. Væske	0,4 mg /ml	5 x 1 ml
5.1 (π)	V03AB15	Naloxone	Inj. Liquid	0,4 mg /ml	5 x 1 ml
5.2 (π)	H04AA01	Glucagon "K" (se note)	Inj. Tørstof + væske	1 mg	0
5.2 (π)	H04AA01	Glucagon "R" (see note)	Inj. Subst + solvens	1 mg	0
5.2: 2 sæt skal medbringes af besætningsmedlemmer med insulinkrævende sukkersyge / 2 sets to be carried by crew members with insulin dependent diabetes.					
Grp. 6 Akut sindsyge og kramper / Mental disorder and convulsion					
6.2(π)	N05BA01	Diazepam Δ	Tablet	5 mg	25 stk.
6.2(π)	N05BA01	Diazepam Δ	Tablets	5 mg	25 pcs.
6.3(π)	N05BA01	Diazepam Δ	Klyзма	4 mg / ml	10 x 2½ ml
6.3(π)	N05BA01	Diazepam Δ	Enema	4 mg / ml	10 x 2½ ml
6.4(π)	N05AD01	Haloperidol Δ	Inj. Væske	5 mg / ml	10 x 1 ml
6.4(π)	N05AD01	Haloperidol Δ	Inj. Liquid	5 mg / ml	10 x 1 ml
6.5(π)	N05CF02	Zolpidem Δ	Tablet	10 mg	20 stk.
6.5(π)	N05CF02	Zolpidem Δ	Tablets	10 mg	20 pcs.
Grp. 7 Infektioner / Infections					
7.1 (π)	J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Tablet	660-800 mg	100 stk.
7.1 (π)	J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Tablets	660-800 mg	100 pcs.
7.4 (π)	J01FA01	Erythromycin	Tablet	500 mg	100 stk.
7.4(π)	J01FA01	Erythromycin	Tablets	500 mg	100 pcs.
7.6 (π)	P01AB01	Metronidazol	Tablet	500 mg	24 stk.
7.6 (π)	P01AB01	Metronidazole	Tablets	500 mg	24 pcs.
7.7(π)	P01AB01	Metronidazol	Supp.	500 mg	20 stk.
7.7 (π)	P01AB01	Metronidazole	Supp.	500 mg	20 pcs.
7.8(π)	J01MA02	Ciprofloxacin	Tablet	250 mg	40 stk.
7.8 (π)	J01MA02	Ciprofloxacin	Tablets	250 mg	40 pcs.
7.9 (π)	J01DD04	Ceftriaxon (se note)	inj. Tørstof + væske	1 g	20 x 1g
7.9 (π)	J01DD04	Ceftriaxon (see note)	inj. Subst + solvens	1 g	20 x 1g
7.10 (π)	-	Tetanus holdig vaccine "K"	Inj. Væske	-	1 stk.
7.10 (π)	-	Vaccine containing Tetanus "R"	Inj. Liquid	-	1 pc.
7.11 (π)	J06BB02	Tetanus immunglobulin "K"	Inj. Væske	250 IU.	1 x 1 ml
7.11 (π)	J06BB02	Tetanus immunglobulin "R"	Inj. Liquid	250 IU.	1 x 1 ml
7.12 (π)	J01CF05	Flucloxacillin	Tablet	500 mg	50 pcs
7.12 (π)	J01CF05	Flucloxacillin	Tablet	500 mg	50 pcs
7.13 (π)	J01EE01	Sulfamethoxazol+ trimitroprim	Tablet	400 / 80 mg	50 pcs.
7.13 (π)	J01EE01	Sulfamethoxazole+ trimitroprim	Tablet	400 / 80 mg	50 pcs.
7.9 Skibe med en overfartstid under 24 timer kan reducere mængden af Ceftriaxon fra 20 x1g til 5 x1 g.					
7.9 Ships which are in engaged in voyage less than 24 hours may reduce the amount of Ceftriaxon from 20 x1g to 5 x1 g					

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Styrke / Strength	Mængde/ Quantity A	
Grp. 8 Malaria / Malaria (se note /see note)					Treatment	Prevention
8.1 (π)	P01BB51	Atovaquon/Proguanil	Tablet	250 / 100 mg	24 stk.	24 stk. /besætningmedl
8.1 (π)	P01BB51	Atovaquon/Proguanil	Tablets	250 / 100 mg	24 pcs.	24 pcs. /crewmember
8.2 (π)	J01AA02	Doxycycline	Tablet	100 mg	40 stk.	80 stk.
8.2 (π)	J01AA02	Doxycycline	Tablets	100 mg	40 pcs	80 pcs.
8.3 (π)	P01BC01	Quinine	Tablet	100 mg	200 stk.	0
8.3 (π)	P01BC01	Quinine	Tablets	100 mg	200 pcs.	0

Malariamidler til behandling skal forefindes i skibe, der sejler til områder med malaria - uanset risiko.

Medicinsk forebyggelse kræves hovedsagelig ved sejlads i høj risikoområder.

Højrisikoområder findes opdateret og beskrevet i Søfartsstyrelsens malariastrategi på følgende link

<http://www.soefartsstyrelsen.dk>.

Drugs for treatment of malaria must be carried by all ships sailing to or in areas where malaria is recorded - irrespective of the risk.

Medical prevention is mainly required for ships sailing in high risk areas.

The High risk areas are available and updated on the "Danish Maritime Authority's malaria strategy" on the following link

<http://www.dma.dk>

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Styrke / Strength	Mængde/ Quantity A
Grp. 9 Hjerte / Cardiac					
9.1	C01DA02	Glycerylnitrat	Mund pray	0,4 mg/dose	1x200 doser
9.1	C01DA02	Glyceryl trinitrate	Oral spray	0,4 mg/dose	1x200 doses
9.3	B01AC06	Acetylsalisylsyre	Tablet	150 mg	100 stk.
9.3	B01AC06	Acetylsalicylic Acid	Tablet	150 mg	100 pcs.
9.4 (π)	C03CA01	Furosemid	Tablet	40 mg	50 stk.
9.4 (π)	C03CA01	Furosemide	Tablet	40 mg	50 pcs.
9.5 (π)	C03CA01	Furosemid	Inj. væske	10 mg/ml	10x4 ml
9.5 (π)	C03CA01	Furosemide	Inj. Liquid	10 mg/ml	10x4 ml
9.6 (π)	C07AB03	Atenolol	Tablet	50 mg	100 stk.
9.6 (π)	C07AB03	Atenolol	Tablet	50 mg	100 pcs.
Grp. 10 Hud / Skin					
10.2	D01AC02	Miconazol	Creme	2%	4 x15 g
10.2	D01AC02	Miconazol	Lotion/Cream	2%	4 x15 g
10.4	D06BA01	Sølvulfadiazin	Creme	1%	2 x 50 g
10.4	D06BA01	Silver sulfadiazine	Lotion/Cream	1%	2 x 50 g
10.5	P03AC04	Permethrin	Creme	5%	30 g
10.5	P03AC04	Permethrin	Lotion/Cream	5%	30 g
10.6	P03AC04	Permethrin	Shampoo	1%	50 ml
10.6	P03AC04	Permethrin	Shampoo	1%	50 ml
10.7	D07AB02	Glukocorticoid gruppe II	Creme	Gruppe II	2 x 30 g
10.7	D07AB02	Glucocorticoid group II	Lotion/Cream	Group II	2 x 30 g

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Styrke / Strength	Mængde/ Quantity A
Grp. 11 Desinficering / Desinfectants					
11.1	-	Klorhexidin/ethanol (se note)	Væske	0.5/85%	175 ml
11.1	-	Chlorhexidine/ethanol (see note)	Liquid	0.5/85%	175 ml
11.2	-	Klorhexidin	Væske	0.2 %	4 x 250 ml
11.2	-	Chlorhexidine	Liquid	0.2 %	4 x 250 ml
11.1: Alternativt kan anvendes Klorhexidin 0,5 % og Ethanol minimum 70 %, i 2 separate flasker. Blandes 1:1 Alternatively, Chlorhexidine 0,5 % and ethanol with a minimum of 70 % in 2 separate bottles. Mix 1:1					
Grp. 12 Mave og tarm / Gastrointestinal					
12.5	A06AD11	Lactulose	Mixtur	667 mg/ml	100 ml
12.5	A06AD11	Lactulose	Mixture	667 mg/ml	100 ml
12.6	A07DA03	Loperamid	Tablet	2 mg	60 pcs.
12.6	A07DA03	Loperamide	Tablet	2 mg	60 pcs.
12.7	-	Glukose/kalium/natriumcitrat /natriumklorid	Pulver	13,5/1,5/2,9/ 2,6 g/pulver	18 x 20,5 g
12.7	-	Glucose/potassium/sodiumcitrate / sodiumchlorid	Powder	13,5/1,5/2,9/ 2,6 g/powder	18 x 20,5 g
12.8 (π)	A02BC01	Omeprazol	Tablet/Kapsel	20 mg	28 pcs.
12.8 (π)	A02BC01	Omeprazole	Tablet/Capsula	20 mg	28 pcs.
12.9	A02A	Antacida	Tablet eller oral opløsning	-	40 stk. eller 250 ml
12.9	A02A	Antacid	Tablet or oral solution	-	40 pcs. or 250 ml
12.10	C05A	Hæmoride creme (skal indeholde glukokortikoid and smertestillende)	Creme/Salve	-	2 x 30 g
12.10	C05A	Anti haemorrhoid agent (Must contain glucocorticoid and analgesi)	Lotion/Ointment	-	2 x 30 g
12.12 (π)	A03FA03	Domperidon	Tablet	10 mg	30 stk.
12.12 (π)	A03FA03	Domperidone	Tablet	10 mg	30 pcs.

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Styrke / Strength	Mængde/ Quantity A
Grp. 13 Øjne og øre / Eyes and ears					
13.2 (π)	S01HA06	Cinchocain	Salve	0,50 %	5 x 1g
13.2 (π)	S01HA06	Cinchocaine	Oinment	0,50 %	5 x 1g
13.3 (π)	S01BA01	Dexamethasone	Dråber	1 mg / ml	5 ml
13.3 (π)	S01BA01	Dexamethasone	Drops	1 mg / ml	5 ml
13.4 (π)	S01EB51	Pilocarpin	Dråber	2 %	10 ml
13.4 (π)	S01EB51	Pilocarpine	Drops	2 %	10 ml
13.6 (π)	S01AD03	Aciclovir	Salve	3 %	4,5 g
13.6 (π)	S01AD03	Aciclovir	Oinment	3 %	4,5 g
13.8 (π)	S01AA13	Fusidin	Dråber / gel	1 %	5 x 5g
13.8 (π)	S01AA13	Fusidin	Drops / gel	1 %	5 x 5g
13.9	-	Medium til at blødgøre ørevoks, inkl. øresprøjte	-	-	10 ml
13.9	-	Medium to soften earwax, incl. earsyringe	-	-	10 ml
13.11 (π)	S01FA06	Tropicamid	Dråber	1 %	15 ml
13.11 (π)	S01FA06	Tropicamide	Drops	1 %	15 ml
13.12(π)	S02CA03	Ciprofloxacin / Hydrocortison	Øredråber	10+2 mg/ml	3 x 10 ml
13.12(π)	S02CA03	Ciprofloxacien / Hydrocortisone	Eardrops	10+2 mg/ml	3 x 10ml
Grp. 14 Gynækologi /Gynaecology					
14.1 (π)	J02AC01	Fluconazol	Kapsel	150 mg	2 stk.
14.1 (π)	J02AC01	Fluconazole	Capsula	150 mg	2 pcs.
14.2	G02AB01	Methyleergometrin	Tablet	0,125 mg	10 pcs.
14.2	G02AB01	Methyleergometrine	Tablet	0,125 mg	10 pcs.
14.2 skal kun forefindes, HVIS der er kvinder om bord. 14.2 shall only be available IF women on board.					
Grp. 15 Astma og forkølelse / Astma and common cold					
15.1	R05DA09	Dextromethorphan	Tablet	30 mg	40 stk.
15.1	R05DA09	Dextromethorphane	Tablet	30 mg	40 pcs.
15.2 (π)	R03AC03	Terbutalin	Turbohaler	0,5 mg/dose	100 doser
15.2 (π)	R03AC03	Terbutaline	Turbohaler	0,5 mg/dose	100 doses
15.4 (π)	R03BA02	Budesonid	Turbohaler	0,2 mg/dose	100 doser
15.4 (π)	R03BA02	Budesonide	Turbohaler	0,2 mg/dose	100 doses
15.5	R01AA07	Xylometazolin	Dråber / Spray	1 mg / ml	3 x 10 ml
15.5	R01AA07	Xylometazoline	Drops / Spray	1 mg / ml	3 x 10 ml
15.6(π)	R03AC02 R03CC02	Salbutamol	Inj. Væske	0,5 mg/ml	5 x 1 ml
15.6(π)	R03AC02 R03CC02	Salbutamol	Inj. Liquid	0,5 mg/ml	5 x 1 ml
Grp. 16 Infusionsvæsker og lign. / Liquid for infusion and similar (se note / see note)					
16.1 (π)	B05BB01	Natriumklorid	Inf. Væske	0.9 %	10 x 1 liter
16.1 (π)	B05BB01	Sodium chloride	Inf. Liquid	0.9 %	10 x 1 litre
16.2 (π)	B05BB02	Glucose + Natriumklorid	Inf. Væske	25/4,5 mg/ml	10 x 1 liter
16.2 (π)	B05BB02	Glucose + Sodium chlorid	Inf. Liquid	25/4,5 mg/ml	10 x 1 litre
16.5 (π)	V07AB	Natriumklorid	Væske	0.9 %	20 x 20 ml
16.5 (π)	V07AB	Sodium chloride	Liquid	0.9 %	20 x 20 ml
16.6(π)	B05AA06	Gelatine, Natriumchlorid	Inf. væske	40G / 7G	5 x 500 ml
16.6(π)	B05AA06	Gelatine, Sodium Chlorid	Inf. Liquid	40G / 7G	5 x 500 ml
Infusionsvæskerne må ikke være i glasbeholder Infusion liquids may not be in glass container					

Besætningens medbragte medicin / Crew member's private medicine

Medicinens navn <i>Name of medicine</i>	Tilhører besætningsmedlem <i>Belongs to crewmember</i>	Antal <i>Quantity</i>	Daglig dosis <i>Daily dosage</i>	Dato ind <i>Date in</i>	Kvittering modtagelsen <i>Signature receiving</i>	Dato ud <i>Date out</i>	Kvittering for udlevering <i>Signature for extradition</i>

**Fortegnelse og Kontrol dokument
over medicinsk udstyr**

**Inventory and Control Document
of Medical Equipment**

Grp. No.	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantity A
A. Genoplivningsudstyr / Resuscitation equipment		
A.1	Mobilt genoplivningsudstyr, klargjort (se note)	1 sæt
A.1	Mobile resuscitation equipment (see note)	1 set
A.5	Tungeholdere, størrelse 3	1 stk.
A.5	Guidel airway, size 3	1 pcs.
A.8	Kraftig klædesaks	1 stk.
A.8	Strong scissors for clothes	1 pcs.
A.9	Sugekatetre, lige, CH 12	5 stk.
A.9	Suction catheters, straight, CH 12	5 pcs.
A.10	Tæppe til behandling af hypotermi	1 stk.
A.10	Blanket for treatment of hypothermia	1 pcs.
A.11	Almindelige tæpper	6 stk.
A.11	Ordinary blankets	6 pcs.
A.12	Saturationsmåler (fingermodel)	1 stk.
A.12	Puls oximeter (finger)	1 pcs.
A.13	Hudson maske med reservoirpose med ca. 1,8 m slange	5 stk.
A.13	Hudson mask with reservoir bag with approx. 1.8 m tube	5 pcs.
A.1: Meddelelser A kapitel A IX B, bilag 1 / A.1: Notice A Chapter IX B, annex 1		
B. Forbindinger og plastre / Dressings and adhesive tape		
B.1	Sterile gazeekompresser, ca.5 x 5 cm, ca.8 lag	20 stk.
B.1	Sterile gaze compress, approx.5 x 5 cm, approx. 8 layers	20 pcs.
B.2	Sterile gazeekompresser, ca. 10 x 10 cm, ca. 8 lag	20 stk.
B.2	Sterile gaze compress, approx.10 x10 cm, approx. 8 layers	20 pcs.
B.3	Steril absorberende ikke-klæbende forbindelse, ca. 20 x 30 cm	5 stk.
B.3	Sterile absorbent non-adhesive surgical dressing bandage, approx. 20 x 30 cm	5 pcs.
B.4	Sterile kompresforbindinger, ca. 8 cm	10 stk.
B.4	Sterile compress bandages, approx. 8 cm	10 pcs.
B.5	Imprægnerede net, ca. 10 x 10 cm, "Jelonet"	2 x 10 stk.
B.5	Impregnated nets, approx. 10 x 10 cm, "Jelonet"	2 x 10 pcs.
B.6	Steril absorberende forbindinger, ikke klæbende, ca. 10 x 10 cm	5 stk.
B.6	Sterile non-adhesive surgical dressing bandages, approx. 10 x 10 cm	5 pcs.
B.7	Gazeviskers, usterile	100 stk.
B.7	Gauze swaps, non-sterile	100 pcs.
B.8	Tube gaze til fingerforbindinger	10 stk.
B.8	Tube shaped gauze for finger bandaging	10 pcs.
B.9	Elastisk gazebind, ca. 4 cmx4m	10 ruller
B.9	Elastic gauze bandage, approx. 4 cmx4m	10 rolls
B.10	Hæfteplaster med sårpude, forskellige størrelser, lommepakning	1 pakke
B.10	Adhesive tape with compress, various sizes, pocket pack	1 pack
B.11	Hæfteplaster med sårpude, ca. 6 cm x 1m	5 pakker
B.11	Adhesive tape with compress, approx. 6 cm x 1m	5 packs
B.12	Fikseringsplaster Fixomull, ca. 10 cm x 10 m	1 rulle
B.12	Adhesive tape Fixomull, approx. 10 cm x 10 m	1 roll
B.13	Fikseringsplaster, "Englehud", ca. 2 cm	2 ruller
B.13	Adhesive tape, "peau d'ange", approx. 2 cm	2 rolls
B.14	Årepresse til pulsåreblødning	1 stk.
B.14	Torniquet to arteriel bleeding	1 pc.

Grp. No.	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantity A
C. Udstyr til hygiejne / Equipment for sanitation		
C.1	Engangshandsker af latex, usterile, X-large	100 stk.
C.1	Disposable gloves, latex, non-sterile, X-large	100 pcs.
C.2	Engangshandsker af latex, usterile, large	100 stk.
C.2	Disposable gloves, latex, non-sterile, large	100 pcs.
C.5	Vaskesvampe, éngangs	25 stk.
C.5	Bath sponge, disposable	25 pcs.
C.6	Beskyttelsesbriller	1 stk.
C.6	Protective goggles	1 pc.
C.7	Steril afdækning, ca. 50 x 50 cm	5 stk.
C.7	Sterile drape, approx. 50 x 50 cm	5 pcs.
C.8	Flydende medicinsk sæbe pH 4,5	250 ml
C.8	Liquid medical soap pH 4,5	250 ml
C.9	Mundbind 3 lags, bredde 18 cm	50 stk.
C.9	Mask, 3 layer, width 18 cm	50 pcs.
C.10	Ligpose voksen	1 stk.
C.10	Body bag adult	1 pc.
C.11	Engangshandsker af latex, usterile, medium	100 stk.
C.11	Disposable gloves, latex, non-sterile, medium	100 pcs.
C.12	Engangshandsker af latex, usterile, small	100 stk.
C.12	Disposable gloves, latex, non-sterile, small	100 pcs.
C.13	Engangsforklæde	10 stk.
C.13	Disposable apron	10 pcs.
C.14	Lagen, sterilt	1 stk.
C.14	Bed sheet, sterile	1 pc.

Grp. No.	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantity A
D. Sårbehandling / Treatment of wounds		
D.1	Suturtape, "Steri-Strip™"	25 stk.
D.1	Suturetape, "Steri-Strip™"	25 pcs.
D.2	Klæbesutur, Dermabond	6 amuller
D.2	Adhesive suture, Dermabond	6 ampoules
D.4	Ikke-absorberbar sutur, 3.0; 45 cm. FS eller DS 25	12 stk.
D.4	Non-absorbable suture, 3.0; 45 cm. FS or DS 25	12 pcs.
D.5	Rustfri stålæske med låg, ca. 18x9x3 cm	1 stk.
D.5	Instrument box, stainless steel with lid, approx. 18x9x3 cm	1 pc.
D.6	Engangsskalpel, steril, nr. 23	5 stk.
D.6	Disposable scalpel, sterile, no. 23	5 pcs.
D.7	Kirurgisk saks med lige spids	1 stk.
D.7	Surgical scissors w/straight points	1 pc.
D.8	Kirurgisk saks med krum spids	1 stk.
D.8	Surgical scissors w/curved points	1 pc.
D.9	Kirurgisk pincet, ca. 14 - 16 cm	1 stk.
D.9	Surgical forceps (tweezers), approx. 14 -16 cm	1 pc.
D.10	Anatomisk pincet	1 stk.
D.10	Anatomical forceps (tweezers)	1 pc.
D.11	Splintpincet	1 stk.
D.11	Forceps, splinter (tweezers)	1 pc.
D.12	Pean, krum	2 stk.
D.12	Pean, curved	2 pcs.
D.13	Nåleholder	2 stk.
D.13	Suture - holder	2 pcs.
D.14	Barbermaskine (skraber), engangs	3 stk.
D.14	Safety razor, disposable single use	3 pcs.
D.15	Absorberbar hæmostatisk gelatinesvamp, ca.1 x 1 x 1 cm	8 stk.
D.15	Haemostatic absorbable gelatine sponge, approx.1 x 1 x 1 cm	8 pcs.

Grp. No.	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantity A
E. Udstyr til injektion og infusion / Equipment for injection and infusion		
E.1	Kanylebøtte	1 stk.
E.1	Box for contaminated needles	1 pc.
E.2	Afsprøjtningssvaps m. isopropylalkohol 70%	200 stk.
E.2	Alcohol swabs, isopropyl alcohol 70%	200 pcs.
E.3	Staserem	2 stk.
E.3	Torniquet	2 pcs.
E.4	"Optiva*2", intravenøs kanyle, 1,1 x 32, 20 g	20 stk.
E.4	"Optiva*2", intravenous needle, 1.1 x 32, 20 g	20 pcs.
E.5	"Vecafix®", fikseringsplaster til intravenøs kanyle	20 stk.
E.5	"Vecafix®", fixing plaster for intraveneos needle	20 pcs.
E.6	Kanyle, steril til engangsbrug, 0,6 x 30 (~ 23G x 1 1/4)	50 stk.
E.6	Needle, sterile, disposablesingle use, 0.6 x 30 (~ 23G x 1 1/4)	50 pcs.
E.7	Sprøjter, sterile til engangsbrug, Luer, 2 ml	20 stk.
E.7	Syringes, sterile, single use, Luer, 2 ml	20 pcs.
E.8	Sprøjter, sterile til engangsbrug, Luer, 5 ml	20 stk.
E.8	Syringes, sterile, single use, Luer, 5 ml	20 pcs.
E.9	Sprøjter, sterile til engangsbrug, Luer, 10 ml	20 stk.
E.9	Syringes, sterile, single use, Luer, 10 ml	20 pcs.
E.10	Infusionssæt med gevindtilslutning til E.4, sterile til engangsbrug	10 stk.
E.10	Infusion set with threaded connection for E.4, sterile, single use	10 pcs.
F. Udstyr til medicinsk undersøgelse / Equipment for medical examination		
F.1	Blodtryksmåler	1 stk.
F.1	Instrument for measuring blood pressure	1 pc.
F.2	Stetoskop	1 stk.
F.2	Stethoscope	1 pc.
F.3	Digitalt lægetermometer	2 stk.
F.3	Digital clinical thermometer	2 pcs.
F.4	Pencillygte m. batterier	2 stk.
F.4	Pencil lamp w/batteries	2 pcs.
F.5	Tungespatel, usterile, engangs	10 stk.
F.5	Tongue depressor, non-sterile, single use disposable	10 pcs.
F.7	Hypotermi Termometer	1 stk
F.7	Hypotermi thermometer	1 pc.

Grp. No.	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantity A
G. Udstyr til undersøgelse af blod og urin / Equipment for examination of blood and urine		
G.1	"Multistix® 5", urintest for blod/glukose/protein/nitrit/leukocytter	50 stk.
G.1	"Multistix® 5", Urinetest for blood/glucose/protein/nitrite/leukocytes	50 pcs.
G.2	Graviditetstest	2 stk.
G.2	Pregnancy test kit	2 pcs.
G.5	Malariatest, minimum for Plasmodium Falciparum, inkl. reagens og brugervejledning.	6 stk.
G.5	Malaria test, minimum for Plasmodium Falciparum, incl. reagens and userinstruction.	6 pcs.
G.6	Lancetter (fingerprikker)	6 stk.
G.6	Lancets (finger pricker)	6 pcs.
G.7	Udstyr til måling af blodsukker (se note)	0
G.7	Equipment for measuring bloodsugar (see note)	0
G.2	Skal kun forefindes, HVIS der er kvinder om bord.	
G.2	Shall only be available IF women on board.	
G.5+G.6	Malarietest og Lancetter skal forefindes i skibe, der sejler til områder med malaria - uanset risiko.	
G.5+G.6	Malaria test and Lancets must be carried by all ships sailing to or in areas where malaria is recorded - irrespective of the risk.	
G.7	1 sæt skal medbringes af besætningsmedlemmer med insulinafhængig diabetes	
G.7	1 set to be carried by crew members with insulin dependent diabetes.	
H. Øjenundersøgelse og behandling / Eye examination and treatment		
H.1	Pencillygte med UV lys, inkl. batterier	1 stk.
H.1	Lamp with UV light w/batteries	1 pc.
H.2	Fluoretsstrips til farvning af øjet	10 stk.
H.2	Fluorescent colour for the eye	10 pcs.
H.3	Vatpinde, sterile	50 stk.
H.3	Cotton sticks, sterile	50 pcs.
H.4	Horners hulmejsel	1 stk.
H.4	Horners spud	1 pc.
H.5	Øjenklap	2 stk.
H.5	Eye patch	2 pcs.
H.6	Øjenskyllévæske, Natriumchlorid 0,9%, 250 ml	8 stk.
H.6	Eye irrigating liquid, Sodium chloride 0.9%, 250 ml	8 pcs.
I. Udstyr til tømning af urinblæren / Equipment for drainage of urinary bladder		
I.1	Engangskatetre m. krum spids, CH 14, til mænd	5 stk.
I.1	Catheters for single use w/ curved tip, CH 14 for men	5 pcs.
I.2	Urinkolbe, plastic	1 stk.
I.2	Bed bottle, plastic	1 pc.
I.3	Engangskatetre CH 14 til kvinder	5 stk.
I.3	Catheters for single use, CH 14 for women	5 pcs.

Grp. No.	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantity A
J. Udstyr til forstuvninger og brud / Equipment for sprains and fractures		
J.1	"ColdHot™" kulde/varme omslag, 11 x 27 cm	1 stk.
J.1	"ColdHot™" pack 11x24 cm	1 pc.
J.2	Elastikbind, ca. 10 cmx5m	3 stk.
J.2	Elastic bandage, approx. 10 cmx5m	3 pcs.
J.3	Elastikbind, ca. 6 cmx5m	1 stk.
J.3	Elastic bandage, approx. 6 cmx5m	1 pc.
J.4	Trekantet tørklæde (Mitella)	2 stk.
J.4	Triangular scarf (Mitella)	2 pcs.
J.5	Sikkerhedsnåle	12 stk.
J.5	Safety pins	12 pcs.
J.6	Fingerskinne til immobilisering af ét led	5 stk.
J.6	Finger splint for immobilisation of one joint	5 pcs.
J.7	Fingerskinne til immobilisering af to led	5 stk.
J.7	Finger splint for immobilisation of two joints	5 pcs.
J.8	Polsterbind, ca. 10 cm x 2,7 m	10 stk.
J.8	Padded bandages, approx. 10 cm x 2.7 m	10 pcs.
J.9	Gipsbind, ca. 12 cm x 2m	10 stk.
J.9	Plaster bandage, approx. 12 cm x 2m	10 pcs.
J.10	Fikseringsplaster, Tensoplast, ca. 2 cm x 2m	2 ruller
J.10	Adhesive tape, Tensoplast, approx. 2 cm x 2m	2 rolls
K. Udstyr til immobilisering og transport / Equipment for immobilisation and transportation		
K.1	Båre, egnet til K.5 (se note)	1 stk.
K.1	Stretcher, suitable for K.5 (see note)	1 pc.
K.2	Oppustelig frakturskinne, senior, hel arm	1 stk.
K.2	Inflatable fracture splint, senior, full arm	1 pc.
K.3	Oppustelig frakturskinne, senior, hel ben	1 stk.
K.3	Inflatable fracture splint, senior, full leg	1 pc.
K.4	Stiv halskrave, indstillelig til forskellige positioner	2 stk.
K.4	Stiff neck collar, adjustable	2 pcs.
K.5	Langt rygbræt, inkl. seler (se note)	1 stk.
K.5	Spineboard, incl straps (see note)	1 pc.
K.2 - K.4 pakkes og opbevares sammen. / K.2-K.4 packed and stored together		
K.1 + K.5 Meddelelser A kapitel IX B, bilag 3 / Notice A Chapter IX B, annex 3		

Grp. No.	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantity A
L. Tandlægeudstyr / Equipment for dental examination and treatment (Se note / see note)		
L.1	Coltosol®, færdigblandet tandcement i tuber à 8g (se note)	5 stk.
L.1	Coltosol®, dental filling material ready for use, tubes of 8 g (see note)	5 pcs.
L.2	Skyllekanyle	1 stk.
L.2	Dental rinse needle	1 pc.
L.3	Specialinstrument til tandcement	1 stk.
L.3	Special instrument for dental filling material	1 pc.
L.4	Mundspejl	1 stk.
L.4	Mouth mirror	1 pc.
L.5	Ekskavator	1 stk.
L.5	Excavator	1 pc.
L.6	Fyldningsfjerner	1 stk.
L.6	Filling remover	1 pc.
L.7	Rustfri stålæske med låg til tandudlægeudstyr	1 stk.
L.7	Instrument box, stainless steel with lid for dental equipment	1 pc.
<p>L: Tandlægeudstyr skal ikke forefindes på skibe med fart mindre end 175 sømil fra EU/EØS landes kyster. L: Dental equipment shall not be on ships in voyage less than 175 nautical miles from EU/EEA countries' coast L.1: Tandcement skal være inklusive instrument til uddrivning af cement fra tuben. L.1: Filling material shall include instrument for expulsion of the material from the tube.</p>		
M. Udstyr til sygepleje / Requisites for nursing		
M.1	Medicinmålebægre, ca. 25 ml, éngangs	20 stk.
M.1	Graduated measuring cup, approx. 25 ml, disposable	20 pcs.
M.2	Varmedunk	1 stk.
M.2	Hot-water bottle	1 pc.
M.3	Bækken	1 stk.
M.3	Bedpan	1 pc.
N. Insektbekæmpelsesmidler og kloreringsmidler til rensning af drikkevand/ Insecticides and chlorinating agents for purifying drinking water (se note / see note)		
N.1	Insektbekæmpelsesmiddel - pulver form (se note)	1 dåse
N.1	Insecticide, not specified - powder form (see note)	1 tin
N.2	Kloreringsmiddel til drikkevand, 100 g	2 stk.
N.2	Chlorinating agent for drinking water, 100 g	2 pcs.
N.3	Insektbekæmpelsesmiddel- væskeform (se note)	1 dåse
N.3	Insecticide - liquid form (see note)	1 Tin
<p>N.1 + N.2 + N.3 Klor og insektbekæmpelsesmidler må ikke opbevares sammen med lægemidler og medicinsk udstyr. N.1 + N.2 + N.3 Chlor and insecticides must not be stored within the ship medicine chest</p>		
O. Fortegnelser, lægebog m.v. / Inventories, Medical Guide, etc.		
O.2	Søfartsstyrelsens Lægebog eller Lægebog for Søfarende	1 stk.
O.2	The Maritime Medical Manual issued by the Danish Maritime Authority or Medical guide for seafarers issued by Seahealth	1 pc.
O.3	Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning (se note)	1 stk kat. A
O.3	Inventory, Control Document and User Instruction (see note)	1 pc. Cat. A
O.5	Radio Medical Optegnelser	1 stk.
O.5	Radio Medical Records	1 pc.
<p>O.2 Skal også forefindes på engelsk, såfremt der om bord er påmønstret ikke dansktalende besætningsmedlemmer. O.2 Must also be available in English, if crewmembers who don't speak Danish have signed on. O.3 skal være tilgængelig i digital eller printet udgave. O.3 must be available in digital or printed version.</p>		

Labels

<p>1.1 + 1.3 Gas / Gas Medicinsk ilt / Medical Oxygen Indikation : Bevidstløse uden vejtrækning, Bevidstløse med vejtrækning, Medtaget almen tilstand. Slag mod kraniet, Større kvæstelser, Vejtrækningsbesvær Indication: Unconscious, Weak general condition, Blows to the skull. Severe injuries, Difficulty breathing. Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring: Opbevares adskilt fra brandbare gasser og stoffer. Hold flasketemperaturen under 50°C / Storage: Keep away from flammable gases and substances. Keep the temperature of the bottle under 50°C</p>
<p>2.1 inj. væske / inj. liquid Lidocain 10 mg/ml Indikation / Indication: Lokalbedøvelse / Local anaesthetic Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>2.2 gel / gel Lidocain 2% Indikation/Indication: Lokalbedøvelse / Local anaesthetic Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>3.1 tablet / tablet Paracetamol 500 mg Indikation / Indication: Svage smerter / Weak pain; Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>3.2 tablet / tablet Ibuprofen 400 mg Indikation / Indication: Moderate smerter / Moderate pain Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>3.4 inj.væske / inj.liquid Δ Morfin 10 mg/ml Indikation / Indication: Stærke smerter / Severe pain; Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>3.5 kapsel / capsule Δ Tramadol 50 mg Indikation / Indication: Moderate smerter / Moderate pain Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>3.7 gel / ointment Diclofenac 11.6 mg/g Indikation / Indication: Smerte / pain , inflammation I huden / inflammation of the skin. Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: < 30 C</p>
<p>3.8 Supp. / Supp. Diclofenac 50 mg Indikation / Indication: Galdesten, nyresten, ledsmerter / Gall stone, kidney stone, pain in joint Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>4.1 inj.væske / inj.liquid Adrenalin 1 mg/ml Indikation / Indication: Allergisk Shock / Allergic shock Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage:2- 8°C</p>

<p>4.2 kapsel / capsule Acrivastin 8 mg Indikation / Indication: Allergi / Allergy Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>4.3 inj.væske / inj.liquid Hydrocortisonsuccinat 100 mg Indikation / Indication: Allergi / Allergy Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>4.5 tablet / tablet Δ Cinnarizin 25 mg Indikation / Indication: Søsyge / Seasickness Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>5.1 inj.væske / inj.liquid Naloxone 0,4 mg/ml Indikation/Indication: Morfin antidot / Morphine antidote Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>6.2 tablet / tablet Δ Diazepam 5 mg Indikation / Indication: Angst / Anxiety Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>6.3 klysma / enema Δ Diazepam 4 mg/ml Indikation / Indication: Kramper / Convulsions; Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>6.4 inj.væske / inj liquid Δ Haloperidol 5 mg/ml Indikation / Indication: Sindsyge / Mental disease Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>6.5 tablet / tablet Δ Zolpidem 10 mg Indikation / Indication: Søvnløshed / insomnia Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>7.1 tablet / tablet Phenoxymethylpenicillin 660 - 800 mg Indikation / Indication: Infektioner / Infections Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>7.4 tablet / tablet Erythromycin 500 mg Indikation / Indication: Infektioner / Infections Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>7.6 tablet / tablet Metronidazol 500 mg Indikation / Indication: Infektioner / Infections Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>

<p>7.7 suppositorie / suppository Metronidazol 500 mg Indikation / Indication: Infektioner / Infections / MFAG table 10 Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>7.8 tablet / tablet Ciprofloxacin 250 mg Indikation / Indication: Infektioner / Infections Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>7.9 inj.substans. / inj.substance Ceftriaxon 1 g Indikation / Indication: Infektioner / Infections Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>7.10 vaccine / vaccine indeholdende / contain Tetanus Indikation / Indication: Forebyggelse mod stivkrampe / Tetanus prevention Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: 2- 8°C</p>
<p>7.11 immunglobulin / immunglobuline Tetanus 250 I.E./ml / 250 I.U/ml Indikation / Indication: Forebyggelse mod stivkrampe / Tetanus prevention Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: 2- 8°C</p>
<p>7.12 tablet / tablet Flucloxacillin 500 mg Indikation / Indication: Infektioner / Infections Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>7.13 tablet / tablet Sulfamethoxazol+trimitroprim 400mg + 80 mg Indikation / Indication: Infektioner / Infections Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>8.1 tablet / tablet Atovaquon/Proguanil 250/100 mg Indikation / Indication: Malaria forebyggelse / Malaria Prevention. Malaria behandling / Malaria treatment Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>8.2 tablet / tablet Doxycyklin 100 mg Indikation / Indication: Malaria forebyggelse / Malaria prevention Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>8.3 tablet / tablet Quinin/ Quinine 100 mg Indikation / Indication: Malaria behandling / Malaria treatment Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>9.1 spray / aerosol Glycerylnitrat / Glyceryl trinitrate 0,4 mg/doses Indikation / Indication: Hjertekrampe / Angina pectoris Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: 2 - 25°C</p>

<p>9.3 tablet / tablet Acetylsalicylsyre / acetylsalicylic acid 150 mg Indikation / Indication: Blodfortyndende / Blood thinning Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>9.4 tablet / tablet Furosemid 40 mg Indikation / Indication: Vanddrivende / Diuretic Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>9.5 inj.væske / inj.liquid Furosemid 10 mg/ ml Indikation / Indication: Vanddrivende / Diuretic Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory. Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>9.6 tablet / tablet Atenolol 50 mg Indikation / Indication: Blodtryksforhøjelse / High blood pressure Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>10.2 creme / lotion Miconazol 2% Indikation / Indication: Hudsvarp / Skinfungus Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: < 25°C</p>
<p>10.4 creme / cream Sølvulfadiazin / Silver sulfadiazine 1% Indikation / Indication: Brandsår / Burns Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>10.5 creme / lotion Permethrin 5% Indikation / Indication: Fladlus og fnat / Crab lice and scabies Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>10.6 shampoo / shampoo Permethrin 1% Indikation / Indication: Lus/ Lice Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>10.7 creme / lotion Glukokortikoid gruppe II /glucocorticoid group II Indikation / Indication: Eksem / Eczema Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>11.1 væske / liquid Chlorhexidin / Ethanol 0,5%/85% Indikation / Indication: Desinfektion af instrumenter / Disinfection of instruments Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>11.2 væske / liquid Chlorhexidin 0,2% Indikation / Indication: Behandling af urene sår, mundskyl / Treatment of dirty wounds, mouth rinse. Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>

<p>12.5 væske / liquid Lactulose 667 mg/ml Indikation / Indication: Forstoppelse / Constipation Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>12.6 tablet / tablet Loperamid 2 mg Indikation / Indication: Diaré / Diarrhea Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>12.7 pulver / powder Glucose / kalium / magnesium / natrium citrat/natrium/ Glucose/potassium/magnesium/sodium citrate/sodium 30/1,1/0,11/2,1 g Indikation / Indication: Væske- og salttab / Rehydration Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>12.8 kapsler / capsule Omeprazol 20 mg Indikation / Indication: Mavesår / Stomach ulcer Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>12.9 tablet eller oral opløsning / tablet or oral solution Antacida Indikation / Indication: Sure opstød og halsbrand / acid indigestion and heartburn Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>12.10 rektalsalve / rectal ointment Glukokortikoid Indikation / Indication: Analkløe / Anal pruitis Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: < 25 C</p>
<p>12.12 Tablet / Tablet Domperidon 10 mg Kvalme og opkastning / Nausea and vomiting MFAG table 7,8,10,13,15,20 Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory. Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / Storage normal temperatur.</p>
<p>13.2 øjensalve / eyeointment Cinchocain 5 mg/g Indikation / Indication: Lokalbedøvelse af øje / Local anaesthetic of eye Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>13.3 øjendråber / eyedrops Dexamethason 1 mg/ml Indikation / Indication: Allergi / Regnbuehindebetændelse / Allergic / Inflammatory eye diseases Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>13.4 øjendråber / eyedrops Pilocarpin 20 mg/ml Indikation / Indication: Grøn stær / Glaucoma Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>13.6 øjensalve / eyeointment Aciclovir 30 mg/g Indikation / Indication: Virusinfektion / Viral infection Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>

<p>13.8 øjendråber / eyedrops Fusidinsyre 10mg/g i/in 5g tube Indikation: Øjeninflammation / Inflammation of eye Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read user instruction in the inventory. Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur</p>
<p>13.9 væske / liquid Medium til at blødgøre ørevoks/ Medium to soften earwax Indikation / Indication: Blødgøring og løsning af ørevoks / Softening and dissolving of earwax Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>13.11 øjendråber / eyedrops Tropicamid 1% Indikation / Indication: Øjeninflammation / Inflammation of eye Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>13.12 Øredråber / Eardrops Ciprofloxacin / Hydrocortison 10+2 mg Indikation: Øregangs eksem / Ear canal eczema Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read user instruction in the inventory. Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical</p>
<p>14.1 kapsel / capsule Fluconazol 150 mg Indikation / Indication: Skedesvamp / Vaginal fungus Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>14.2 tablet / tablet Methylergometrin 0,125 mg Indikation / Indication: Blødning efter fødsel / Bleeding after giving birth Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>15.1 Tablet / Tablet Dextromethorphan 30 mg Indikation / Indication: Hoste / Cough Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>15.2 turbuhaler / turbuhaler Terbutalin 0,5 mg/dose Indikation / Indication: Astma / Asthma Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>15.4 turbuhaler / turbuhaler Budesonid 0,2 mg/dose Indikation / Indication: Astma / Asthma Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>15.5 næsespray / dråber / nose spray / drops Xylometazolin 1 mg/ml Indikation / Indication: Forkøelse / Common cold Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>
<p>15.6 Inj / Inj. Salbutamol 0,5 mg/ml Indikation / Indication: Astma / Asthma MFAG table 9 Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature</p>

16.1 inf.væske / inf.liquid

Natriumklorid / sodium chloride 9 mg/ml

Indikation / Indication: Blodtab / Loss of blood

Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory

Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical

Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

16.2 inf.væske / inf.liquid

Glucose og natrium / glucose and sodium 25/4,5 mg/ml

Indikation / Indication: Væsketab / Rehydration

Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory

Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical

Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

16.5 Inj. væske / inj.liquid

Natriumklorid / sodium chloride 9 mg/ml

Indikation / Indication: Væske til gennemskylning af intravenøs kanyle, sårbehandling, øjenbehandling / Fluid for flushing intravenous needle, treatment of wound, treatment of eyes

Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory

Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical

Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

16.6 inf.væske / inf.liquid

Gelofusine 40/7 g

Indikation / Indication: Blodtab / Loss of blood

Ref: Se Fortegnelsens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory

Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical

Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

INDEX

minal infections	28	Bone infection	28
Abstinenskramper	23	Bone-ache	14
Acetylsalicylic acid.	37	Bones, infections	32
Acetylsalicylsyre	37	Brandsår	40
Aciclovir	50	Breathing difficulties	11
Acid indigestion	46	Brud	23
Acrivastin	18	Brugervejledning Lægemiddelstoffer	10
Acrivastine	19	Budesonid.	55
Acute diarrhoea	29	Budesonide.	55
Acute mental disease	23	Burning sensation, skin	42
Acute mental illness	24	Burns	15; 40
Acyclovir	50	Cardiospasm	37
Adrenalin	18	Ceftriaxone	30
Akut diarré	29	Cerumen	51
Akut sindssyge	23; 24	Chlamydia	27
Alcoholic withdrawal symptoms	23	Chlorhexidin.	43
Alkoholabstønsener	23	Chlorhexidine/ethanol.	43
Allantoin	51	Cholera	29
Allergi	18; 19	Cinchocain.	48
Allergic asthma	19; 20	Cinchocaine.	48
Allergic face oedema	19; 20	Cinnarizin	20
Allergic shock	18	Cinnarizine	20
Allergisk ansigtsødem	18; 19	Ciprofloxacin / Hydrocortisone	52; 65; 90
Allergisk astma	18; 19	Ciprofloxacin	29
Allergisk shock	18	Ciprofloxacin / Hydrocortison	52; 65; 79; 90
Allergy	19; 20	Ciprofloxacin	29
Angina pectoris	36; 39	Cold	56
Angst	23; 24	Constipation	44
Antacid	46	Convulsions	23
Antacida	46	Convulsions , universal	24
Antidote, morphine	21	Convulsions, poisoning	24
Antihæmorrhoid creme	47	Convulsions, Withdrawal	24
Anxiety	23; 24	Coronary thrombosis	15; 36; 37
Appendicitis	28; 29; 30	Coronary thrombosis, Preventiv treatment after	39
Arc eye	48	Cough	54
Arthritis	16	Crab lice	41
Asthma	55	Delusions	24
Asthma-like breathing	55	Dexamethason.	48
Astma	39; 55	Dexamethasone.	49
Astmalignende vejrtrækning	55	Dextromethorphan.	54
Atenolol	39	Diarré	44; 45
Atovaquon/Proguanil	33; 34	Diarrhoea	45
Atovaquone/Proguanil	33	Diazepam	23; 24
Back pains	13	Diclofenac	16; 17
Bevidstløs med vejrtrækning	11	Difficulty falling asleep	25
Bevidstløs uden vejrtrækning	11	Dirty wounds, Disinfection	43
Bihulebetændelse	26; 27; 56	Dislocations	23
Bleeding, after birth	54	Domperidon	47
Bleeding, miscarriage	54	Doxycyclin.	33
Blindtarmsbetændelse	27; 28; 29; 30	Doxycycline.	34
Blodforgiftning	30	Dysenteri	29
Blodfortyndning	37	Dysentery	29
Blodprop i hjertet	14; 36; 37	Ear eczema	49; 52
Blodprop i hjertet, forebyggelse efter	39	Eksem	42
Blodtab	57	Ekstra medicin og udstyr pga covid-19	99
Blood poisoning	30	Epilepsi	23
Blood-thinning	37	Epilepsy	24
Blurred vision	49	Epinephrine	18
Blødning, abort	53	Ernæringserstatning	57
Blødning, fødsel	53	Erythromycin.	27
Boil in the throat	28; 29	Extra medicine and equipment due to Covid-19	99

Eye diseases, Allergic	49	Hudkløe	42
Eye diseases, Inflammatory	49	Hudsvamp	40; 53
Eyes, Treatment	58	Hudsvie	42
Feber	13	Human tetanus immunoglobulin	31
Febertilstande	45	Humant tetanus immunoglobulin	31
Female reproductions organs, infection	28	Hydrocortison.	19
Fever	13	Hydrocortisonsuccinate	20
Feverish conditions	45	Hypoglycaemic coma	22
Fladlus	41	Hæmorider	47
Flucloxacillin	32	Hænder, desinficering	43
Fluconazol	53	Høfeber	18
Fluconazole.	53	Ibuprofen.	13; 14
Flushing, intravenous needle	58	Imminent premature birth	55; 56
Fnat	41	Indsovningsbesvær	25
Food substitute	58	Infection of female reproductions organs	28
Forbrændinger	14	Infection, Urinary tract	32
Forhøjet blodtryk	37; 38; 39	Infections, oral cavity	26; 27
Forkølelse	56	Infections, stomachulcer	27
Forstoppelse	44	Infektioner, stafylokokker	32
Fortegnelse og kontrol dokument over lægemiddelstoffer	60	Inflammation i huden	16
Fortegnelse og Kontrol dokument over medicinsk udstyr	68	Inflammation of the skin	16
Fractures	14; 15; 23	Inflammation, eye	50
Frontal sinusitis	56	Inflammation, middle ear	26; 27
Fungus	40	Inflammation, throat	26
Furosemid	37; 38	Inflammatoriske øjensygdomme	51
Furosemide	38	Inflammatory eye diseases	51
Fusidin	50	Injuries	15
Galdesten	14	Insect bites	42
Gall stone	15	Insektbid	42
Gennemskylning, intravenøskanyle	58	Insomnia	25
Gigt	16	Instrumenter, desinficering	43
Glaucoma	49	Instruments, Disinfection	43
Glucagon	22	Insulin shock	22
Glucocorticoid group II	42	Insulinshock	22
Glucose and sodium chloride.	58	Insulintilfælde	22
Glucose og natriumklorid.	57	Intact skin, Disinfection	43
Glukokortikoid gruppe II	42	Intakt hud, desinficering	43
Glyceryl trinitrate	36	Intestinal infections	28
Glycerylnitrat	36	Inventory and Control Document of Active Pharmaceutical Ingredients	60
Gonoré	29	Inventory and Control Document of Medical Equipment	68
Gonorrhoea	29	Itching, rectum	47
Grøn stær:	49	Kidney stone	15
Haemorrhoids	47	Klorhexidin.	43
Hallucinationer.	24	Klorhexidin/ethanol.	43
Hallucinations.	24	Kløe, endetarmen	47
Haloperidol	24	Kløestillende	12
Haloperidole.	24	Knoglebrud	13
Halsbetændelse	26; 27	Knogleinfektion	27; 28; 32
Halsbrand	46	Knoglesmerter	13
Halsbyld	27; 28; 29	Kolera	29
Hands, Disinfection	43	Kramper	23
Hay fever	19	Kramper, forgiftninger	23
Headache	13	Kramper, universelle	23
Heart pain	36; 37; 39	Kvalme	47
Heartburn	46	Kvalme og opkastninger	24
Helvedesild	50	Kvæstelser	14
Herpes	50	Kæbehulebetændelse	56
High blood pressure	38; 39	Lactulose	44
Hjertekrampe	36; 37	Lavt blodsukker	22
Hostestillende	54	Ledscred	23
Hovedpine	13		

Ledsmerter	13	Natriumklorid.	57
Legionella	27	Nausea	47
Lette til moderate smerter	15	Nausea and vomiting	24
Lice	41	Neglesvamp	53
Lidocain	11; 12	Nyrebækkenbetændelse	29; 30
Lidocaine	12	Nyresten	14
Local anaesthetic, eye	48	Nældefeber	18
Local anaesthetics	12	Omeprazol	46
Lokalbedøvelse	11; 12	Open fractures	30
Lokalbedøvelse, øjet	48	Opkastninger	45; 47
Loperamid	44	Otitis media	56
Loperamide.	45	Oxygen	11
Loss of blood	57	Pain	16
Loss of fluid	45	Pain during defecation	47
Loss of liquid	57	Pain in joints	14
Loss of liquids	58	Pains, eye	49
Low blood sugar	22	Pandehulebetændelse	56
Lung edema	38	Paracetamol	13
Lungebetændelse	26; 27; 30; 32	Paracetamol.	13
Lungepest	29	Period pain	14
Lus	41	Permethrin.	41
Major wounds	15; 30	Phenoxymethylpenicillin	26
Malaria, behandling	35	Phenoxymethylpenicillin	26
Malaria, forebyggelse	33	Pilocarpin	49
Malaria, prevention	33; 34	Pilocarpine	49
Malaria, treatment	34; 35	Pneumonia	26; 27; 30; 32
Malarone®	33	Pneumonic plague	29
Mani, vildskab	24	Psoriasis	42
Mania, wildness	24	Psyisk uro	24
Mavesår	46	Pyelitis	29
Mavesårsinfektioner	27	Quinin.	35
Maxillary sinusitis	56	Quinine	35
Medical oxygen	11	Rainbow vision	49
Medicinsk ilt.	11	Regnbuesyn	49
Medtaget almen tilstand	11	Relieves itching	12
Mellemørebetændelse	26; 27	restlessness	23
Meningitis	30	Rygsmertter	13
Menstruationssmerter	13	Sabutamol	56
Mental restlessness	24	Salbutamol	56
Methylergometrin.	53	Salttab	45
Methylergometrine.	54	Scabies	41
Metronidazol.	27; 28	Seasickness	20
Metronidazole	28	Sepsis	30
Miconazol	40	Severe bronchitis	29
Miconazole	40	Severe injuries	11
Moderate pain:	14	Severe pain	15
Moderate smerter:	13	Shingles	50
Modgift, morfin	21	Shock, forebyggelse	57
Morfin	14	Shock, prevention	57
Morphine	15	Silver sulfadiazine	40
Motoric restlessness,	24	Sinusitis	26; 27; 56
Motorisk uro	24	Skin fungus	40; 53
Mouth rinse	43	Smerter	16
Mundhuleinfektioner	26; 27	Smerter i hjertet	36; 37
Mundskylning	43	Smerter, afføring	47
Muscle pain	14	Smerter, øje	49
Muskelsmerter	13	Sodium chloride	57; 58
Nail fungus	53	Solskoldning	42
Naloxon	21	Staphylococci	32
Naloxone	21	Stivkrampemodgift	31
Natriumklorid	58	Stivkrampevaccine	30

Stomach ulcer	46	Underlivsinfektioner	27; 28
Stops breathing	21	Urene sår, desinficering	43
Store sårskader	14; 30	Urethritis	29
Stærke smerter:	14	Urinrørsbetændelse	29
Større kvæstelser	11	Urinvejsinfektioner	32
Sulfamethoxazol+trimitroprim	32	urotilstande	23
Sulfamethoxazole+trimitroprim	32	Urticaria	19
Sunburns	42	User instruction Active Pharmaceutical Ingredients	10
Sure opstød	46	Vaginal fungus	53
Suture of wounds	12	Vand i lungerne	37; 38
Svage smerter	13	Vejtrækningsbesvær	11
Svamp	40	Vomiting	45; 47
Svamp i skeden	53	Vrangforestillinger	24
Svejsøjne	48	Væsketab	45; 57
Svær bronkitis	29	Weak general condition	11
Syning af sår	11	Weak pains:	13
Sølvulfadiazin	40	Weak to moderate pain	15
Søsyge	20	Welders eye	48
Søvnløshed	25	Wounds, Treatment	58
Sårbehandling.	58	Xylometazolin.	56
Tandbyld	27; 28; 29	Xylometazoline.	56
Tarminfektioner	27; 28	Zolpidem	25
Terbutalin	55	Øjenbehandling	58
Terbutalin.	55	Øjenbetændelse	50
Tetanus antidote	31	Øjensygdom, Allergiske	48
Tetanus holdig vaccine	30	Øjensygdom, Inflammatoriske	48
Tetanus vaccine	31	Øregangs eksem	52
tetanustoxid	31	Øregangseksem	48
Tooth abscess	28; 29	Ørevoks.	51
Tramadol	15	Åbne knoglebrud	30
Tropicamid	51		
Truende for tidlig fødsel	56		
Truende for tidlig fødsel.	55		
Tågesyn	49		
Udsættende vejtrækning	21		
Unconscious with breathing	11		
Unconscious without breathing	11		

Rekvisition lægemiddelstoffer og medicinsk udstyr
Requisition Active Pharmaceutical Ingredient and Medical Equipment

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Mængde / Amount
1.1	V03AN01	Medicinsk ilt	Gas	
1.1	V03AN01	Oxygen, Medical	Gas	
1.3	V03AN01	Medicinsk ilt passende til A.1	Gas	
1.3	V03AN01	Oxygen, Medical suitable to A.1	Gas	
2.1	N01BB02	Lidocain	Inj. Væske	
2.1	N01BB02	Lidocaine	Inj. Liquid	
2.2	D04AB01	Lidocain	Gel	
2.2	D04AB01	Lidocaine	Gel	
3.1	N02BE01	Paracetamol	Tablet	
3.1	N02BE01	Paracetamol	Tablets	
3.2	M01AE01	Ibuprofen	Tablet	
3.2	M01AE01	Ibuprofen	Tablets	
3.4	N02AA01	Morfin Δ	Inj. Væske	
3.4	N02AA01	Morphine Δ	Inj. Liquid	
3.5	N02AX02	Tramadol Δ	Tablet / Kapsel	
3.5	N02AX02	Tramadol Δ	Tablet / Capsula	
3.7	M02AA15	Diclofenac	Gel	
3.7	M02AA15	Diclofenac	Gel	
3.8	M01AB05	Diclofenac	Supp.	
3.8	M01AB05	Diclofenac	Supp	
4.1	C01CA24	Adrenalin "K"	inj. Væske	
4.1	C01CA24	Epinephrine "R"	inj. Liquid	
4.2	R06AX18	Acrivastin	Kapsel	
4.2	R06AX18	Acrivastine	Capsula	
4.3	H02AB09	Hydrocortison	inj. Tørstof+ Væske	
4.3	H02AB09	Hydrocortisonsuccinate	inj. Subst + solvens	
4.5	N07CA02	Cinnarizin Δ	Tablet	
4.5	N07CA02	Cinnarizine Δ	Tablets	
5.1	V03AB15	Naloxon	Inj. Væske	
5.1	V03AB15	Naloxon	Inj. Liquid	
5.2	H04AA01	Glucagon "K"	inj. Tørstof+ Væske	
5.2	H04AA01	Glucagon "R"	inj. Subst + solvens	
6.2	N05BA01	Diazepam Δ	Tablet	
6.2	N05BA01	Diazepam Δ	Tablets	
6.3	N05BA01	Diazepam Δ	Klysma	
6.3	N05BA01	Diazepam Δ	Enema	
6.4	N05AD01	Haloperidol Δ	Inj. Væske	
6.4	N05AD01	Haloperidol Δ	Inj. Liquid	
6.5	N05CF02	Zolpidem Δ	Tablet	
6.5	N05CF02	Zolpidem Δ	Tablets	

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Mængde / Amount
7.1	J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Tablet	
7.1	J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Tablets	
7.4	J01FA01	Erythromycin	Tablet	
7.4	J01FA01	Erythromycin	Tablets	
7.6	P01AB01	Metronidazol	Tablet	
7.6	P01AB01	Metronidazol	Tablets	
7.7	P01AB01	Metronidazol	Supp.	
7.7	P01AB01	Metronidazol	Supp.	
7.8	J01MA02	Ciprofloxacin	Tablet	
7.8	J01MA02	Ciprofloxacin	Tablets	
7.9	J01DD04	Ceftriaxon	inj. Tørstof+ Væske	
7.9	J01DD04	Ceftriaxon	inj. Subst + solvens	
7.10	-	Tetanus holdig vaccine "K"	Inj. Væske	
7.10	-	Vaccine containing Tetanus "R"	Inj. Liquid	
7.11	J06BB02	Tetanus immunglobulin "K"	Inj. Væske	
7.11	J06BB02	Tetanus immunglobulin "R"	Inj. Liquid	
7.12	J01CF05	Flucloxacillin	Tablet	
7.12	J01CF05	Flucloxacillin	Tablets	
7.13	J01EE01	Sulfamethoxazol+trimitroprim	Tablet	
7.13	J01EE01	Sulfamethoxazol+trimitroprim	Tablets	
8.1	P01BB51	Atovaquon/Proguanil	Tablet	
8.1	P01BB51	Atovaquon/Proguanil	Tablets	
8.2	J01AA02	Doxycycline	Tablet	
8.2	J01AA02	Doxycycline	Tablets	
8.3	P01BC01	Quinin	Tablet	
8.3	P01BC01	Quinine	Tablets	
9.1	C01DA02	Glyceryl nitrat	Mund pray	
9.1	C01DA02	Glyceryl trinitrate	Oral spray	
9.3	B01AC06	Acetylsalisylsyre	Tablet	
9.3	B01AC06	Acetylsalicylic Acid	Tablets	
9.4	C03CA01	Furosemid	Tablet	
9.4	C03CA01	Furosemide	Tablets	
9.5	C03CA01	Furosemid	Inj. væske	
9.5	C03CA01	Furosemide	Inj. Liquid	
9.6	C07AB03	Atenolol	Tablet	
9.6	C07AB03	Atenolol	Tablets	

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Mængde / Amount
10.2	D01AC02	Miconazol	Creme	
10.2	D01AC02	Miconazol	Lotion / Cream	
10.4	D06BA01	Sølvulfadiazin	Creme	
10.4	D06BA01	Silver sulfadiazine	Lotion / Cream	
10.5	P03AC04	Permethrin	Creme	
10.5	P03AC04	Permethrin	Lotion / Cream	
10.6	P03AC04	Permethrin	Shampoo	
10.6	P03AC04	Permethrin	Shampoo	
10.7	D07AB02	Glukocorticoid group II	Creme	
10.7	D07AB02	Glukocorticoid group II	Lotion / Cream	
11.1	-	Klorhexidin/ethanol	Væske	
11.1	-	Chlorhexidine/ethanol	Liquid	
11.2	-	Klorhexidin	Væske	
11.2	-	Chlorhexidine	Liquid	
12.5	A06AD11	Lactulose	Mixtur	
12.5	A06AD11	Lactulose	Mixture	
12.6	A07DA03	Loperamid	Tablet	
12.6	A07DA03	Loperamide	Tablets	
12.7	-	Glucose/potassium/magnesium/sodium	Powder	
12.7	-	Glucose/potassium/magnesium/sodium	Powder	
12.8	A02BC01	Omeprazol	Tablet / Kapsel	
12.8	A02BC01	Omeprazole	Tablets / Capsula	
12.9	A02A	Antacida	Tablet eller oral opløsning	
12.9	A02A	Antacid	Tablets or oral solution	
12.10	C05A	Hæmoride creme(skal indeholde glukokortikoid and smertestillende)	Creme/Salve	
12.10	C05A	<i>Anti haemorrhoid agent (Must contain glucocorticoid and analgesi)</i>	Lotion/ointment	
12.12	A03FA03	Domperidon	Tablet	
12.12	A03FA03	Domperidone	Tablets	

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Mængde / Amount
13.2	S01HA06	Cinchocain	Salve	
13.2	S01HA06	Cinchocaine	Oinment	
13.3	S01BA01	Dexamethason	Dråber	
13.3	S01BA01	Dexamethasone	Drops	
13.4	S01EB51	Pilocarpin	Dråber	
13.4	S01EB51	Pilocarpine	Drops	
13.6	S01AD03	Aciclovir	Salve	
13.6	S01AD03	Aciclovir	Oinment	
13.8	S01AA13	Fusidin	Dråber / gel	
13.8	S01AA13	Fusidin	Drops / gel	
13.9	-	Medium til at blødgøre ørevoks, inkl. øresprøjte	-	
13.9	-	Medium to soften earwax, incl. earsyringe	-	
13.11	S01FA06	Tropicamid	Dråber	
13.11	S01FA06	Tropicamide	Drops	
13.12	S02CA03	Ciprofloxacin / Hydrocortison	Øredråber	
13.12	S02CA03	Ciprofloxacin / Hydrocortisone	Eardrops	
14..1	J02AC01	Fluconazol	Kapsel	
14.1	J02AC01	Fluconazole	Capsula	
14.2	G02AB01	Methylergometrin	Tablet	
14.2	G02AB01	Methylergometrine	Tablets	
15.1	R05DA09	Dextromethorphan	Tablet	
15.1	R05DA09	Dextromethorphan	Tablets	
15.2	R03AC03	Terbutalin	Turbohaler	
15.2	R03AC03	Terbutaline	Turbohaler	
15.4	R03BA02	Budesonid	Turbohaler	
15.4	R03BA02	Budesonide	Turbohaler	
15.5	R01AA07	Xylometazolin	Dråber / spray	
15.5	R01AA07	Xylometazoline	Drops / spray	
15.6	R03AC02 R03CC02	Salbutamol	Inj. Væske	
15.6	R03AC02 R03CC02	Salbutamol	Inj. Liquid	
16.1	B05BB01	Natriumklorid	Inf. Væske	
16.1	B05BB01	Sodium chloride	Inf. Liquid	
16.2	B05BB02	Glucose + Natriumklorid	Inf. Væske	
16.2	B05BB02	Glucose + sodiumchlorid	Inf. Liquid	
16.5	V07AB	Natriumklorid (20 ml)	Væske	
16.5	V07AB	Sodium chloride (20 ml)	Liquid	
16.6	B05AA06	Gelatine, Natriumchlorid	Inf. Væske	
16.6	B05AA06	Gelatine, Sodium Chlorid	Inf. Liquid	

Grp. No	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantity
A.1	Mobilt genoplivningsudstyr, klargjort	
A.1	Mobile resuscitation equipment, ready for use	
A.5	Tungeholdere, størrelse 3	
A.5	Guidel airway, size 3	
A.8	Kraftig klædesaks	
A.8	Strong scissors for clothes	
A.9	Sugekatetre, lige, CH 12	
A.9	Suction catheters, straight, CH 12	
A.10	Tæppe til behandling af hypotermi	
A.10	Blanket for treatment of hypothermia	
A.11	Almindelige tæpper	
A.11	Ordinary blankets	
A.12	Saturationsmåler (fingermodel)	
A.12	Puls oximeter (finger)	
A.13	Hudson maske med reservoirpose med ca. 1,8 m slange	
A.13	Hudson mask with reservoir bag with approx. 1.8 m tube	
B.1	Sterile gazeekompresser, ca.5 x 5 cm, ca.8 lag	
B.1	Sterile gauze compress, approx.5 x 5 cm, approx. 8 layers	
B.2	Sterile gazeekompresser, ca. 10 x 10 cm, ca. 8 lag	
B.2	Sterile gauze compress, approx.10 x 10 cm, approx. 8 layers	
B.3	Steril absorberende ikke-klæbende forbinding, ca. 20 x 30 cm	
B.3	Sterile absorbent non-adhesive surgical dressing bandage, approx. 20 x 30 cm	
B.4	Sterile kompresforbindinger, ca. 8 cm	
B.4	Sterile compress bandages, approx. 8 cm	
B.5	Imprægnerede net, ca. 10 x 10 cm, "Jelonet"	
B.5	Impregnated nets, approx. 10 x 10 cm, "Jelonet"	
B.6	Sterile absorberende forbindinger, ikke klæbende, ca. 10 x 10 cm	
B.6	Sterile absorbent bandages, non-adhesive surgical dressing bandages, approx. 10 x 10 cm	
B.7	Gazeviskers, usterile	
B.7	Gauze swaps, non-sterile	
B.8	Tube gaze til fingerforbindinger	
B.8	Tube shaped gauze for finger bandaging	
B.9	Elastisk gazebind, ca. 4 cm x 4m	
B.9	Elastic gauze bandage, approx. 4 cm x 4m	
B.10	Hæfteplaster med sårpude, forskellige størrelser, lommepakning	
B.10	Adhesive tape with compress, various sizes, pocket pack	
B.11	Hæfteplaster med sårpude, ca. 6 cm x 1m	
B.11	Adhesive tape with compress, approx. 6 cm x 1m	
B.12	Fikseringsplaster Fixomull, ca. 10 cm x 10 m	
B.12	Adhesive tape Fixomull, approx. 10 cm x 10 m	
B.13	Fikseringsplaster, "Englehud", ca. 2 cm	
B.13	Adhesive tape, "peau d'ange", approx. 2 cm	
B.14	Årepresse til pulsåreblødning	
B.14	Torniquet to arterial bleeding	

Grp. No	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantity
C.1	Engangshandsker af latex, usterile, X-large	
C.1	Disposable gloves, latex, non-sterile, X-large	
C.2	Engangshandsker af latex, usterile, large	
C.2	Disposable gloves, latex, non-sterile, large	
C.5	Vaskesvampe, éngangs	
C.5	Bath sponge, disposable	
C.6	Beskyttelsesbriller	
C.6	Protective goggles	
C.7	Steril afdækning, ca. 50 x 50 cm	
C.7	Sterile drape, approx. 50 x 50 cm	
C.8	Flydende medicinsk sæbe pH 4,5	
C.8	Liquid medical soap pH 4,5	
C.9	Mundbind 3 lags, bredde 18 cm	
C.9	Mask, 3 layer, width 18 cm	
C.10	Ligpose voksen	
C.10	Body bag adult	
C.11	Engangshandsker af latex, usterile, medium	
C.11	Disposable gloves, latex, non-sterile, medium	
C.12	Engangshandsker af latex, usterile, small	
C.12	Disposable gloves, latex, non-sterile, medium	
C.13	Engangsforklæde	
C.13	Disposable apron	
C.14	Lagen, sterilt	
C.14	Bed sheet, sterile	
D.1	Suturtape, "Steri-Strip™"	
D.1	Suturetape, "Steri-Strip™"	
D.2	Klæbesutur, Dermabond	
D.2	Adhesive suture, Dermabond	
D.4	Ikke-absorberbar sutur, 3.0; 45 cm. FS eller DS 25	
D.4	Non-absorbable suture, 3.0; 45 cm. FS or DS 25	
D.5	Rustfri stålæske med låg, ca. 18 x 9 x 3 cm	
D.5	Instrument box, stainless steel with lid, approx. 18 x 9 x 3 cm	
D.6	Engangsskalpel, steril, nr. 23	
D.6	Disposable scalpel, sterile, no. 23	
D.7	Kirurgisk saks med lige spids	
D.7	Surgical scissors w/straight points	
D.8	Kirurgisk saks med krum spids	
D.8	Surgical scissors w/curved points	
D.9	Kirurgisk pincet, ca. 14 - 16 cm	
D.9	Surgical forceps (tweezers), approx. 14 -16 cm	
D.10	Anatomisk pincet	
D.10	Anatomical forceps (tweezers)	
D.11	Splintpincet	
D.11	Forceps, splinter (tweezers)	
D.12	Pean, krum	
D.12	Pean, curved	

Grp. No	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantity
D.13	Nåleholder	
D.13	Suture - holder	
D.14	Barbermaskine (skraber), engangs	
D.14	Safety razor, disposable single use	
D.15	Absorberbar hæmostatisk gelatinesvamp, ca.1x1x1 cm	
D.15	Haemostatic absorbable gelatine sponge, approx.1x1x1 cm	
E.1	Kanylebøtte	
E.1	Box for contaminated needles	
E.2	Afsprøjtningssvaps m. isopropylalkohol 70 %	
E.2	Alcohol swabs, isopropyl alcohol 70 %	
E.3	Staserem	
E.3	Torniquet	
E.4	"Optiva*2", intravenøs kanyle, 1,1 x 32, 20 g	
E.4	"Optiva*2" , intravenous needle, 1.1 x 32, 20 g	
E.5	"Vecafix®", fikseringsplaster til intravenøs kanyle	
E.5	"Vecafix®", fixing plaster for intraveneos needle	
E.6	Kanyle, steril til engangsbrug, 0,6 x 30 (~ 23G x 1 1/4)	
E.6	Needle, sterile, disposablesingle use, 0.6 x 30 (~ 23G x 1 1/4)	
E.7	Sprøjter, steril til engangsbrug, Luer, 2 ml	
E.7	Syringes, sterile, single use, Luer, 2 ml	
E.8	Sprøjter, steril til engangsbrug, Luer, 5 ml	
E.8	Syringes, sterile, single use, Luer, 5 ml	
E.9	Sprøjter, steril til engangsbrug, Luer, 10 ml	
E.9	Syringes, sterile, single use, Luer, 10 ml	
E.10	Infusionssæt med gevindtilslutning til E.4, sterile til engangsbrug	
E.10	Infusion set with threaded connection for E.4, sterile, single use	
F.1	Blodtryksmåler	
F.1	Instrument for measuring blood pressure	
F.2	Stetoskop	
F.2	Stethoscope	
F.3	Digitalt lægetermometer	
F.3	Digital clinical thermometer	
F.4	Pencillygte m. batterier	
F.4	Pencil lamp w/batteries	
F.5	Tungespatel, usteril, engangs	
F.5	Tongue depressor, non-sterile, single use disposable	
F.7	Hypotermi Termometer	
F.7	Hypotermi thermometer	

Grp. No	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantity
G.1	"Multistix®" 5, urintest for blod/glukose/protein/nitrit/leukocytter	
G.1	"Multistix®" 5, Urinetest for blood/glucose/protein/nitrite/leukocytes	
G.2	Graviditetstest	
G.2	Pregnancy test kit	
G.5	Malariatest, minimum for Plasmodium Falciparum, inkl. reagens og brugervejledning.	
G.5	Malaria test, minimum for Plasmodium Falciparum, incl. reagens and userinstruction.	
G.6	Lancetter (fingerprikker)	
G.6	Lancets (finger pricker)	
H.1	Pencillygte med UV lys, inkl. batterier	
H.1	Lamp with UV light w/batteries	
H.2	Fluoretsstrips til farvning af øjet	
H.2	Fluorescent colour for the eye	
H.3	Vatpinde, sterile	
H.3	Cotton sticks, sterile	
H.4	Horners hulmejsel	
H.4	Horners spud	
H.5	Øjenklap	
H.5	Eye patch	
H.6	Øjenskylllevæske, Natriumchlorid 0,9%, 250 ml	
H.6	Eye wash, Sodium chlorid 0.9%, 250 ml	
I.1	Engangskatetre m. krum spids, CH 14, til mænd	
I.1	Catheters for single use w/ curved tip, CH 14 for men	
I.2	Urinkolbe, plastic	
I.2	Bed bottle, plastic	
I.3	Engangskatetre CH 14 til kvinder	
I.3	Catheters for single use, CH 14 for women	

Grp. No	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantity
J.1	"ColdHot™" kulde/varme omslag, ca.11 x 27 cm	
J.1	"ColdHot™" pack approx. 11 x 27 cm	
J.2	Elastikbind, ca. 10 cm x 5m	
J.2	Elastic bandage, approx. 10 cm x 5m	
J.3	Elastikbind, ca. 6 cm x 5m	
J.3	Elastic bandage, approx. 6 cm x 5m	
J.4	Trekantet tørklæde (Mitella)	
J.4	Triangular scarf (Mitella)	
J.5	Sikkerhedsnåle	
J.5	Safety pins	
J.6	Fingerskinne til immobilisering af ét led	
J.6	Finger splint for immobilisation of one joint	
J.7	Fingerskinne til immobilisering af to led	
J.7	Finger splint for immobilisation of two joints	
J.8	Polsterbind, ca. 10 cm x 2,7 m	
J.8	Padded bandages, approx. 10 cm x 2.7 m	
J.9	Gipsbind, ca. 12 cm x 2m	
J.9	Plaster of paris bandage, approx. 12 cm x 2m	
J.10	Fikseringsplaster, Tensoplast, ca. 2 cm x 2m	
J.10	Adhesive tape, Tensoplast, approx. 2 cm x 2m	
K.1	Båre, egnet til K.5	
K.1	Stretcher, suitable for K.5	
K.2	Oppustelig frakturskinne, senior, hel arm	
K.2	Inflatable fracture splint, senior, full arm	
K.3	Oppustelig frakturskinne, senior, hel ben	
K.3	Inflatable fracture splint, senior, full leg	
K.4	Stiv halskrave, indstillelig til forskellige positioner	
K.4	Stiff neck collar, adjustable	
K.5	Langt rygbræt, inkl. seler	
K.5	Spineboard, incl straps	
L.1	"Coltosol®", færdigblandet tandcement i tuber à 8 g	
L.1	"Coltosol®", dental filling material ready for use, tubes of 8 g	
L.2	Skyllekanyle	
L.2	Dental rinse needle	
L.3	Specialinstrument til tandcement	
L.3	Special instrument for dental filling material	
L.4	Mundspejl	
L.4	Mouth mirror	
L.5	Ekskavator	
L.5	Excavator	
L.6	Fyldningsfjerner	
L.6	Filling remover	
L.7	Rustfri stålæske med låg til tandudlægeudstyr	
L.7	Instrument box, stainless steel with lid for dental equipment	

Grp. No	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantity
M.1	Medicinmålebægre, ca. 25 ml, éngangs	
M.1	Graduated measuring cup, approx. 25 ml, disposable	
M.2	Varmedunk	
M.2	Hot-water bottle	
M.3	Bækken	
M.3	Bedpan	
N.1	Insektbekæmpelsesmiddel - pulver form	
N.1	Insecticide, not specified - powder form	
N.2	Kloreringsmiddel til drikkevand, 100 g	
N.2	Chlorinating agent for drinking water, 100 g	
N.3	Insektbekæmpelsesmiddel- væskeform	
N.3	Insecticide - liquid form	
O.2	Lægebog autoriseret af Søfartsstyrelsen eller Lægebog for Søfarende	
O.2	Medical Manual authorized by the Danish Maritime Authority or Medical guide for Seafarers issued by Seahealth	
O.3	Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning kat. A (Download, www.soefartsstyrelsen)	
O.3	Inventory, Control Document and User Instruction Cat. A (Download, www.dma.dk)	
O.5	Radio Medical Optegnelser	
O.5	Radio Medical Records	

O.2 Skal også forefindes på engelsk, såfremt der om bord er påmønstret ikke dansktalende besætningsmedlemmer.

O.2 Must also be available in English, if crewmembers who don't speak Danish have signed on.

O.3 skal være tilgængelig i digital eller printet udgave. www.soefartsstyrelsen.dk

O.3 must be available in digital or printed version. www.dma.dk

Ændringer / Changes

October 2021

Tilføjet Identifikation af skib (Side 1)

Tilføjet 13.12 Ciprofloxacin / Hydrocortison- øredråber

16.3 Hydroxyethylstivelse udgår

Tilføjet 16.6 Gelatine, Natrium chlorid erstatter 16.3

Tilføjet B.14 Årepresse til pulsåreblødning

Tilføjet C.13 Engangsforklæde

Tilføjet F.7 Hypotermi termometer

Tilføjet I.3 Engangskatetre CH 14 til kvinder

Ændret N.1 Insektbekæmpelsesmiddel, ikke specificeret- **pulver form**

Tilføjet N.3 Insektbekæmpelsesmiddel, ikke specificeret- **væskeform**

Added Identification of ship (page 1)

Added 13.12 Ciprofloxacin / Hydrocortisone - eardrops

16.3 Hydroxyethyl amoid is discontinued product

Added 16.6 Gelatine sodium Chlorid replace 16.3

Added B.14 Torniquet to artieriel bleeding

Added C.13 Dispasable apron

Added F.7 Hypotermi thermometer

Added I.3 Catheters for single use, CH 14 for women

Changed N.1 Insecticide, not specified - **powder form**

Added N.3 Insecticide, not specified - **liquid form**

July 2021

6.3 Diazepam klyksma styrke rettet tilbage til 4mg/ml - beklager ulejligheden

7.10 Vaccine Tetanus- label tilrettet

COVID-19 tillæg - overskrifter rettet. Tilføjet at hurtigtest skal være CE mærket.

6.3 Diazepam enema streingth corrected back to 4mg/ml - Sorry for the inconvenience

7.10 Vaccine Tetanus - label corrected

COVID-19 add on - the headlines corrected. Added that the quick test have to be CE marked.

February 2021

Tilføjet 8.4 Artemether og lumefantrine i ”add medicine covid- 19”.

Til behandling af Malaria.

Add. 8.4 Artemether and lumefantrine in ”add medicine covid-19”.

For treatment of Malaria.

January 2021

Tilføjet side med ekstramedicin og medicinsk udstyr i forbindelse med Covid-19. side 97->

Det er frivilligt om skibet vil medbringe medicinen og udstyr eller dele deraf.

Added page with additional medicine and medical equipment in connection with Covid-19. Page 97->

It is optional if the ship will bring the medicine and equipment or part of it

8.2 Doxycyclin styrke ændret til 100 mg

8.2 Doxycyclin strength changed to 100 mg

October 2020

6.3 Klysma Diazepam styrke ændret til 5 mg/ml

6.3 Enema Diazepam strength changed to 5 mg/ml

7.10 Tetanus holdig vaccine - styrke fjernet, da det kommer an på hvad der udleveres - følg råd fra Radio Medical

7.10 Tetanus-containing vaccine - strength removed as it depends on what is delivered - follow advice from Radio Medical.

Rettet i 8.1 Brugervejledning for behandlingen af Malaria

Corrected 8.1 User instruction for treatment of Malaria

Marts 2020

Alle ændringer fremgår nu af sidste side i dokumentet.

All changes are now on last page in the document.

7.1 Tablet Phenoxymethylpencillin ændret til 660 - 800 mg.

7.1 tablet Phenoxymethylpencillin changed to 660 - 800 mg.

15.3 Inj. Terbutalin 0,5 mg/ml er erstatet med 15.6 Inj. Salbutamol 0,5 mg/ml

1.3 Inj. Terbutalin 0,5 mg/ml is changed to 15.6 Inj. Salbutamol 0,5 mg/ml

D.4 Sutur fjernet firma navn.

D.4 Sutur removed company name

August 2017

3.6 ændret til: 3.8 Diclofenac suppositorier 50 mg 50 stk.

7.10 ændret til tetanustoksid holdig vaccine 1. stk.

8.1 (Behandling) Brugervejledning rettet

0.2 Tilføjet nye lægebog for søfarende fra Seahealth

3.6 changed to: 3.8 Diclofenac suppositorie 50 mg 50 pcs.

7.10 Change to: Vaccine containing Tetanustoxid 1 pc.

8.1 (Treatment) User instruction corrected.

0.2 Add. the new Medical guide for seafarers from Seahealth

Ekstra medicin og udstyr pga covid-19 /

Extra medicine and equipment due to Covid-19

Tillægsmedicin pga. Covid-19. Det er frivilligt at medbringe nedenstående / Extra medicine due to Covid- 19. It is not mandatory to bring below medicine on bord					
Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutecal Ingredient	Adm. Form/ Form	Styrke / Strength	Mængde/ Quentety A
4.6	H02AB06	Prednisolon	tbl.	25 mg	30 stk.
4.6	H02AB06	Prednisolon	tablets.	25 mg	30 pcs.
5.2	H04AA01	Glucagon "K"	inj. Tørstof + Væske	1 mg	2 stk.
5.2	H04AA01	Glucagon "R"	inj. Subst + solvens	1 mg	2 pcs.
7.14	J01CR02	Amoxicillin/clavulansyre	tbl.	500/125 mg	20 stk.
7.14	J01CR02	Amoxicillin/clavulanacid	tablets.	500/125 mg	20 pcs.
7.15	J01FA10	Azithromycin	tbl.	500 mg	5 x 3stk.
7.15	J01FA10	Azithromycin	tablets.	500 mg	5 x 3 pcs.
8.4	P01BF01	Artemether and lumefantrine *)	tbl.	20 mg / 120 mg	24 stk
8.4	P01BF01	Artemether and lumefantrine *)	tablets.	20 mg / 120 mg	24 pcs
9.7	B01AB10	Tinzaparin	inj.	4.500IE	1 boks af 10 stk.
9.7	B01AB10	Tinzaparine	inj.	4.500IE	1 box of 10 pcs.
12.13	A04AA01	Ondasetron	tbl.	4 mg	10 stk.
12.13	A04AA01	Ondasetron	tablets.	4 mg	10 pcs.
12.14	A06AD65	Movicol	oral opløsning	46,6 mg kaliumchlorid, 13,125 g macrogol 3350, 350,7 mg natriumchlorid, 178,5 mg natriumhydrogencarbonat.	4 bokse af 8 stk.
12.14	A06AD65	Movicol	oral solution	46,6 mg kaliumchlorid, 13,125 g macrogol 3350, 350,7 mg natriumchlorid, 178,5 mg natriumhydrogencarbonat.	4 boxes of 8 pcs.

*) Til højrisiko Malaria områder / High risk Malaria areas

Grp. No.	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quentety A
Tillægsudstyr pga. Covid-19. Det er frivilligt at medbringe nedenstående / Extra equipment due to Covid- 19. It is not mandatory to bring below medical equipment on board		
A.19	Iltbrille	2 stk.
A.19	Nasal Cannula	2 pcs.
A.20	Venturi iltmaske med sæt af justerbare diluter	2 sæt
A.20	Venturi oxygen mask with set of adjustable dilutes	2 sets
G.8	Hurtig test C-reaktiv protein (CRP)	5 stk.
G.8	Rapid test for C- reaktive proteine (CRP)	5 pcs.
G.9	Hurtig test SARS-CoV-2 (Covid-19) (Nasal Swab) * Se note	10 stk.
G.9	Rapid test SARS-CoV-2 (Covid-19) (Nasal Swab)* See note	10 pcs.

Følge producentens vejledning. Se digital vejledning/e-learning på producentens hjemmeside. Testen skal være CE mærket. Follow the manufacturer's guideline. See digital guideline / E-learning on manufacturer's website. The quick test have to be CE marked.

Brugervejledninger / User instruction

Grp. 4. Midler mod allergi, shock og søsyge / Agents for Allergy, Shock and Seasickness			
Allergiske reaktioner, hævelser osv. Oral behandling Covid-19	4.6	Lægemiddelstof:	Prednisolon
		Form:	Tabletter á 25 mg
		Virkning:	Bremser allergiske reaktioner, hævelser.
		Dosering:	Efter ordination af Radio Medical Danmark
	ATC	Bivirkninger:	Forhøjet tryk i øjet, slører infektion. Infektion
	H02AB06	Holdbarhed:	2 år fra produktions dato (Prednisolon, Actavis)
		Opbevaring:	normal temperatur
Anmærkninger:		Søg samråd med Radio Medical.	
Allergic reactions, swellings etc. Oral treatment preferred. Partly COVID spin off.	4.6	Active Pharmaceutical ingredients:	Prenisolon
		Form:	Tablets of 25 mg
		Effect:	Brakes allergic reation, swelling etc.
		Dosage:	After precipstion from Radio Medical
	ATC	Side-effects:	Glaucoma, blurs infections, infektions
	H02AB06	Validity:	2 years from production date (Prednisolon, Actavis)
		Storage:	normal temperature
Remarks:		Consult Radio Medical Denmark	

4.6 Tablet / Tablets
 Prednisolon 25 mg
 Indikation / Indication Allergi / Allergy
 Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory
 Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

Grp. 5. Antidoter / Antidotes

Insulintilfælde Insulinshock Lavt blodsukker	5.2	Lægemiddelstof:	Glucagon.
		Form:	Ready-set bestående af: Injektionssubstans Glucagon 1 mg i hætteglas og sprøjte med 1 ml sterilt vand til intramuskulært brug.
		Virkning:	Frigør sukkerreserver fra leveren. Virker normalt inden 5- 10 minutter. Virkningsvarighed: 10 - 40 minutter.
		Dosering:	Voksne: 1 mg intramuskulært. Kan evt. gentages efter 10 -15 minutter. Når patienten er kommet til bevidsthed gives brød og sød saft.
	ATC	Bivirkninger:	Kvalme og opkastninger kan forekomme. Kan udløse hjertekrampe hos hjertesygge. Hjertekrampe behandles med glycerylnitrat spray (9.1).
	H04AA01	Holdbarhed:	Holdbarhed: Ved almindelig temperatur: 18 måneder fra produktionsdato (Glucagen® HypoKit, Novo Nordisk). Ved 2 - 8°C: 36 måneder fra produktionsdato. Den blandede opløsning skal anvendes umiddelbart.
		Opbevaring:	Almindelig temperatur eller 2 - 8°C. (Glucagen® HypoKit, Novo Nordisk).
Anmærkninger:		Søg samråd med Radio Medical. Dersom den blandede opløsning er uklar eller med krystaller, må blandingen ikke anvendes.	
Hypoglycaemic coma Insulin shock Low blood sugar	5.2	Active Pharmaceutical ingredients:	Glucagon.
		Form:	Ready-set consisting of: Injection substance Glucagon, 1 mg in a capped vial and a syringe with 1 ml of sterile water for intramuscular use.
		Effect:	Releases sugar reserves from the liver. Normally, takes effect within 5-10 minutes. Effective for 10-40 minutes.
		Dosage:	Adults: 1 mg intramuscularly. May be repeated after 10-15 minutes. When the patient regains consciousness, he is given some bread and sweet juice.
	ATC	Side-effects:	Nausea and vomiting may occur. May cause angina pectoris in people with heart diseases. Angina pectoris is treated with glyceryl trinitrate spray (9.1).
	H04AA01	Validity:	At room temperature: 18 months from the date of production (Glucagen® HypoKit, Novo Nordisk). At 2-8°C: 36 months from the date of production. The mixed dissolution must be used immediately.
		Storage:	Normal temperature or 2-8°C. (Glucagen® HypoKit, Novo Nordisk).
		Remarks:	Consult Radio Medical. If the mixed dissolution is cloudy or contains crystals, it must not be used.

5.2 inj.substans. / inj.substance
 Glucagon 1mg
 Indikation / Indication: Lav blodsukker / Low bloodsugar
 Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory
 Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical
 Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

Grp. 7. Midler mod infektioner / Infections

Kemisk Lungebetændelse	7.14	Lægemiddelstof:	Amoxicillin/clavulansyre
		Form:	Tablets 500+125 mg
		Virkning:	Prevent inflammation. Kills bacteria
		Dosering:	500 mg x 3 times daily
	ATC	Bivirkninger:	Diarré, mavesmerter, kvalme, opkastning. Kløe, hududslæt, svamp i munden
	J01CJ02	Holdbarhed:	3 år fra produktions dato (Amoxicillin/clavulansyre, COpharma ApS)
		Opbevaring:	Normal temperatur
Anmærkninger:		Søg samråd med Radio Medical Allergisk shock er meget sjældent og forekommer normalt inden for 30 minutter efter administration. Behandling: Adrenalin 0,6 mg intramuskulær. (4.1)	
MFAG table 9 Pneumonia after inhalation of poisonous chemical substances	7.14	Active Pharmaceutical ingredients:	Amoxicillin/clavulanacid
		Form:	Tablets 500+125 mg
		Effect:	Prevent inflammation. Kills bacteria
		Dosage:	500 mg x 3 times daily
	ATC	Side-effects:	Diarrhea, Abdominal pain, Nausea, Vomiting. Itching, Skin rash, Fungus in the mouth
	J01CJ02	Validity:	3 years from the date of production (Amoxicillin/clavulansyre, COpharma ApS)
		Storage:	Normal temperature
Remarks:		Consult Radio Medical. Allergic shock is very rare and usually occurs within 30 minutes after administration. Treatment: Adrenaline 0.6mg intramuscular.(4.1)	
Halsbetændelse Mundhuleinfektioner Bihulebetændelse Mellemørebetændelse Lungebetændelse Legionella Chlamydia infektioner Mavesårsinfektioner Alternativ til penicillin ved allergi MFAG tabel 9	7.15	Lægemiddelstof:	Azithromycin
		Form:	Tablet 500mg
		Virkning:	Standser bakteriernes vækst
		Dosering:	Voksne: 500 mg x 1-2 dagligt.
	ATC	Bivirkninger:	Mavesmerter, kvalme, nedsat appetit, kraftsløshed, svimmelhed, smagsforstyrrelser, hovedpine, hudkløe og hududslæt.
	J01FA10	Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Azithromycin, KRKA).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur
Anmærkninger:		Søg samråd med Radio Medical	
Inflammation of the throat Infections of the oral cavity Sinusitis Inflammation of the middle ear Pneumonia Legionella Chlamydia infections Infections in connection with ulcer Alternative to penicillin in case of allergy MFAG table 9	7.15	Active Pharmaceutical ingredients:	Azithromycin
		Form:	Tablets of 500mg
		Effect:	Stops bacterial growth
		Dosage:	Adults: 500 mg x 1-2 daily
	ATC	Side-effects:	Abdominal pain, nausea, decreased appetite, weakness, dizziness, taste disturbances, headache, itchy skin and skin rash.
	J01FA10	Validity:	5 years from date of production (Azithromycin, KRKA)
		Storage:	Normal temperature
Remarks:		Consult Radio Medical	

7.14 Tablet / Tablets
 Amoxicillin/clavulansyre 500/125 mg
 Indikation / Indication: Infektioner / Infections
 Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory
 Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical
 Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

7.15 Tablet / Tablets
 Azithromycin 500 mg
 Indikation / Indication: Infektioner / Infections
 Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory
 Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical
 Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

Grp. 8. Malaria – behandling / Malaria – Treatment

Til behandling af P. Falciparum malaria. På baggrund af: Positiv malaria test for P. Falciparum eller almen sygdomsfornemmelse og feber kombineret med relevant risiko for malaria	8.4	Lægemiddelstof:	Artemether and lumefantrine
		Form:	Tabletter á 20 mg / 120 mg
		Virkning:	Dræbermalaria parasitterne
		Dosering:	Efter kontakt med Radio Medical Danmark. Start omgående med 4 tbl. Derefter: 4 tbl 8 timer efter første dosis 4 tbl 24 timer efter første dosis. 4 tbl. 36 timer efter første dosis. 4 tbl. 48 timer efter første dosis. 4 tbl. 60 timer efter første dosis.
	ATC	Bivirkninger:	Mave-Tarm gener, hudkløe, hududslæt, hovedpine og svimmelhed.
Treatment of P. Falciperum malaria Based on: Positive Malaria Test for P. Falciparum or general malaise and fever combined with relevant risk of malaria	8.4	Active Pharmaceutical ingredients:	Artemether and lumefantrine
		Form:	Tablets 20 mg / 120 mg
		Effect:	Kills the malaria parasite
		Dosage:	Consult Radio Medical Danmark 4 tablets as soon as possible Then: 4 tablets 8 hours later, then 4 tablets 24 hours after the first dose, then 4 tablets 36 hours after the first dose, then 4 tablets 48 hours after the first dose and then 4 tablets 60 hours after the first dose.
ATC	Side-effects:	Gastrointestinal disorders, itchy skin, skin rash, headache and dizziness.	
PO1BF01	Validity:	2 years from production date (Riamet®, Novatis)	
	Storage:	Do not store above 30°C	
	Remarks:	Consult Radio Medical regardless of the result of the malaria test.	

8.4 tablet / tablet
 Artemether and lumefantrine 20 mg / 120 mg
 Indikation / Indication: Malaria behandling / Malaria treatment
 Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory
 Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical
 Opbevaring / storage: ikke over 30° C /Not above 30° C

Grp. 9 Hjerte / Cardiac

Blodfortynding	9.7	Lægemiddelstof:	Tinzaparin
		Form:	Injektion 4500IE
		Virkning:	Blodfortynding
		Dosering:	Efter ordination af Radio Medical Danmark
	ATC	Bivirkninger:	Blødningstendens, blodmangel, irritation ved indstiksstedet, Hæmatomer
	B01AB10	Holdbarhed:	3 år fra produktions dato (Innohep, Paranova, Danmark)
		Opbevaring:	Ikke over 25 °C
Anmærkninger:		Søg samråd med Radio Medical Danmark	
Blood diluting	9.7	Active Pharmaceutical ingredients:	Tinzaparine
		Form:	Injection 4500IE
		Effect:	Blood diluting
		Dosage:	After prescription from Radio Medical Danmark
	ATC	Side-effects:	Bleeding tendency, anemia, injection site irritation, Hematomas.
	B01AB10	Validity:	3 years from production date (Innohep, Paranova, Danmark)
		Storage:	Not above 25 °C
Remarks:		Consult Radio Medical Danmark	

9.7 Inj. / inj.

Tinzaparine 4500IE

Indikation / Indication: Blodfortynding / Blood diluting
Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical
Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature

Grp. 12 Mave og tarm / Gastrointestinal

Kvalme Opkastninger MFAG tabel 7, 8, 10, 13, 15, 20	12.13	Lægemiddelstof:	Ondansetron
		Form:	Tabeletter 4 mg
		Virkning:	Modvirker kvalme og opkast
		Dosering:	Efter ordination fra Radio Medical Danmark
	ATC	Bivirkninger:	Hovedpine, forstoppelse, Rødme og varmfølelse
	A04AA01	Holdbarhed:	5 år fra produktions dato (Aurobindo Pharma)
		Opbevaring:	Normal temperatur
Anmærkninger:		Søg samråd med Radio Medical Danmark	
Nausea Vomiting MFAG table 7, 8, 10, 13, 15, 20	12.13	Active Pharmaceutical ingredients:	Ondansetron
		Form:	Tablets 4 mg
		Effect:	Prevent Nausea and vomiting
		Dosage:	By prescription from Radio Medical Danmark
	ATC	Side-effects:	Headache, Constipation, Redness and warm feeling
	A04AA01	Validity:	5 years from production date (Aurobindo Pharma)
		Storage:	Normal temperature
Remarks:		Consult Radio Medical Danmark	
Forstoppelse	12.14	Lægemiddelstof:	Movicol®
		Form:	Pulver til oral opløsning
		Virkning:	Binder væske i tarmen, hvorved afføringen blødgøres
		Dosering:	Efter ordination fra Radio Medical Danmark
	ATC	Bivirkninger:	Mavesmerter, Anal irritation, Diarré, Flatulens, Kvalme, Meteorisme, Opkastning.
	A03FA03	Holdbarhed:	3 år fra produktions dato (Norgine BV)
		Opbevaring:	Ikke over 25 °C
Anmærkninger:		søg samråd med Radio Medical	
Constipation	12.14	Active Pharmaceutical ingredients:	Movicol®
		Form:	Powder for oral solution
		Effect:	Binds fluid in the intestine, thereby softening the stools
		Dosage:	By prescriptstion from Radio Medical Danmark
	ATC	Side-effects:	Abdominal pain, Anal irritation, Diarrhea, Flatulence, Nausea, Meteorism, Vomiting.
	A03FA03	Validity:	3 years from production date (Norgine BV)
		Storage:	Not above 25 °C
Remarks:		Consult Radio Medical	

12.13 Tablet / Tablets

Ondasetron 4 mg

Indikation / Indication: Kvalme og opkastning / Nausea and vomiting MFAG table 7, 8, 10, 13, 15, 20
Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory.

Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical

Opbevaring / Storage normal temperatur.

12.14 Pulver / Power

Movicol

Indikation / Indication: Forstoppelse / Constipation
Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory.

Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical

Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature